



MISE A JOUR SUR LE CRIQUET PELERIN

FAO Centre d'Intervention Antiacridien d'Urgence



(17.12.2004)



Situation générale au 17 decembre 2004

La situation relative au Crispion pèlerin reste extrêmement sérieuse en Afrique du Nord-Ouest et, dans une moindre mesure, en Afrique de l'Ouest. De nouveaux essaims venant du Sahel sont arrivés dans le nord du Maroc et de l'Algérie. Plusieurs essaims immatures issus d'une reproduction estivale tardive en Afrique de l'Ouest sont également arrivés dans le sud-est de la Mauritanie, le nord-est du Sénégal et l'ouest du Mali. Quelques essaims ont traversé l'est du Sénégal vers la Gambie et le sud du Sénégal. Des opérations de lutte sont en cours dans tous les pays infestés et près d'un demi-million d'hectares a été traité jusqu'à présent en décembre. La situation reste calme le long des deux rives de la mer Rouge.

Des opérations de lutte aérienne et terrestre intensives se poursuivent contre des essaims immatures au **Maroc**, principalement au sud de l'Anti-Atlas et dans le nord-est, ainsi qu'en **Algérie**. Des essaims arrivent encore des aires de reproduction estivale du Sahel. De bonnes pluies sont tombées sur quelques sites le long du versant sud de l'Atlas. Des essaims venant du Mali et du Niger ont été signalés dans le sud de l'Algérie et des deux côtés de la frontière avec la **Libye**. Des ailés grégaires immatures sont dispersés dans l'est de la Libye, le long de la frontière avec l'Egypte. La situation est apparemment calme in **Tunisie**.

Des opérations de lutte aérienne et terrestre se poursuivent également dans le sud de la **Mauritanie** contre des essaims immatures, et quelques petits essaims sont présents dans le nord-ouest où ils sont en cours de maturation; aucun Crispion pèlerin n'a été signalé dans le nord. Au **Mali**, quelques essaims immatures sont présents dans le nord (vallée du Tilemsi et Timétrine) ; des traitements ont été réalisés dans l'est, près de Kayes, contre des essaims immatures. Au **Niger**, des groupes d'ailés immatures étaient présents dans le nord du Tamesna et dans les montagnes de l'Aïr. Au **Cap-Vert**, les éclosions sont en cours dans les îles de Santo Antao et Santiago.

Le 30 novembre, un petit essaim immature a fait son apparition dans le centre de la **Gambie**. La semaine suivante, plusieurs autres essaims sont arrivés des zones adjacentes de l'est du **Sénégal**, atteignant les divisions de *Central River*, *North Bank* et *Upper River*, où des traitements ont été entrepris. Le 8 décembre, des essaims immatures ont été signalés dans le sud du Sénégal le long du fleuve Casamance River, près de Sedhiou (1242N/1533W). Il se peut que quelques essaims aient continué vers les zones adjacentes du nord de la **Guinée Bissau** et de la **Guinée**.

Les informations les plus récentes sur la situation acridienne, des photos et des cartes des dernières infestations sont disponibles sur Internet sur les sites www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm et 193.43.36.11/mapper.

Le Bulletin FAO sur le Crispion pèlerin paraît chaque mois, complété par des mises à jour lors de périodes d'activité intense du Crispion pèlerin. Il est distribué par télécopie, courrier électronique, internet, valise FAO ou courrier par le Group Acridiens et Autres Migrateurs Nuisibles, AGP, FAO, 00100 Rome, Italie.

Téléphone: +39 06 570 52420 (7 jours/semaine, 24 hr)

Téléfax: +39 06 570 55271

E-mail: ecl@fao.org

Internet: www.fao.org

DLIS: www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm