

comisión del codex alimentarius



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA AGRICULTURA
Y LA ALIMENTACIÓN

ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DE LA SALUD



OFICINA CONJUNTA: Viale delle Terme di Caracalla 00100 ROMA Tel: 39 06 57051 www.codexalimentarius.net Email: codex@fao.org Facsimile: 39 06 5705 4593

Tema 6 (a) del programa

**CX/RVDF 04/15/4-Add. 1
Septiembre de 2004**

PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS

**COMITÉ DEL CODEX SOBRE RESIDUOS DE
MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN LOS ALIMENTOS**

Décima quinta reunión

Washington, DC (área metropolitana), Estados Unidos de América, del 26 al 29 de octubre de 2004

**PROYECTO DE LÍMITES MÁXIMOS PARA RESIDUOS DE MEDICAMENTOS
VETERINARIOS (LMRMV)**

OBSERVACIONES EN EL TRÁMITE 6

**Observaciones presentadas por los Estados Unidos de América en respuesta
a la Carta circular CL 2003/24-RVDF**

S

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La presente constituye nuestra respuesta a la Carta circular CL 2003/24-RVDF en la cual se solicitan observaciones sobre el Proyecto de Límites Máximos para Residuos de Medicamentos Veterinarios (LMRMV) en el Trámite 6 del procedimiento del Codex. Estados Unidos agradece la oportunidad de presentar las siguientes observaciones para examen en la 15ª reunión del Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (CCRVDF) la cual será celebrada en muy poco tiempo.

Estados Unidos ofrece las siguientes observaciones:

Cefuroxima

La delegación de los Estados Unidos ha examinado las recomendaciones presentadas por el JECFA y aprueba la recomendación de la 62ª reunión del JECFA de retirar los LMR temporales en la leche de bovinos debido a que no se proporcionó suficiente información para evaluar los residuos en la leche de bovinos.

Cihalotrin

Estados Unidos aprueba el avance de los LMR recomendados porque la IDA y los LMR son ahora permanentes. La delegación de los Estados Unidos señala que el documento CL 2004/17-RVDF indica que el LMR en el hígado de oveja es de 20 µg/kg, mientras que el resumen de la 62ª reunión del JECFA indica que el LMR en el hígado de oveja es de 50 µg/kg.

Foxim

Estados Unidos aprueba la recomendación de la 62ª reunión del JECFA de retirar los LMR temporales para los tejidos y la leche de bovinos. Se conservan los LMR para las ovejas, los cerdos y las cabras.