


Dermatoza nodulară contagioasă

Dermatoza Nodulară Contagioasă (DNC)

- Afectează doar bovinele și bivoli.
- Nu afectează oamenii.
- Focare sezoniere pe parcursul lunilor calde, când insectele sunt foarte active și abundente.
- Cauzează pierderi importante de producție datorită scăderii producției de lapte, probleme de reproducere, avorturi, deteriorarea pieilor, scăderea greutatea corporale, și uneori deces.
- Pierderi adiționale cauzate de restricțiile de mișcare și comerț cu animale.

Cum pot fi infectate animalele Dvs?

- În mare parte prin mușcătura insectelor, așa ca țânțari, muște sau căpușe.
- Prin aducerea bovinelor infectate din zone afectate.
- De asemenea este posibilă prin intermediul adăpătorilor și hrănilor comune, lapte, material seminal (reproducere naturală și inseminare artificială), tratamente veterinare (în cazul în care acele nu se schimbă între animale) și contact direct.



Leziuni ulceroase pe bot



Leziuni ulceroase la nivelul mameloanelor

Tratament

Nu există tratament eficient pentru DNC

Informație suplimentară

Mai multe informații detaliate pot fi descărcate din Manualul privind Dermatoza nodulară contagioasă pentru medici veterinari de aici <http://www.fao.org/3/i7330ro/I7330RO.pdf>

Monitorizați bovinele și notificați cazurile suspecte

- În timpul focarelor sau în zonele expuse riscului, bovinele trebuie să fie monitorizate zilnic.
- Notificați imediat orice suspensiune medicului veterinar sau Serviciului veterinar oficial (telefon de contact **XXXX XXXXXXXX**), care va iniția acțiunile necesare pentru prevenirea răspândirii bolii.
- Când se suspectează DNC, mișcarea animalelor este stopată imediat.

Cum arată DNC?

Animalele infectate prezintă:

- Febră mare, pierderea poftei de mâncare și scăderea producției de lapte.
- Leziuni cutanate rotunde (noduli/cocoloașe) de 1-5 cm (de obicei primele fiind observate pe cap și gât). La bovinele cu părul lung nu se observă ușor, decât dacă pielea este palpată sau udată.
- Numărul nodulilor variază de la câteva (forma ușoară) până la multe care acoperă integral corpul (forma severă).
- Nodulii pot dispărea cu timpul, dar de obicei centrul leziunilor se îndepărtează (cruste), lăsând ulcere profunde care atrag insectele.
- Ulcere pe bot, buze și în interiorul cavității bucale și nazale.
- Secreții nazale și oculare, salivă excesivă.
- Inflamarea ganglionilor limfatici.

Fiți conștienți de faptul că unele animale infectate pot să nu prezinte nici un semn clinic!

©BFS/TSVIATKO ALEXANDROV



Leziuni cutanate pe suprafața întregului corp și mărirea ganglionilor limfatici în forma severă a bolii

A-C-D ©BFS/TSVIATKO ALEXANDROV, B ©EEVA TUPPURAINEN



Leziuni cutanate cu cruste, ulcere și cicatrici

CONTACTE: Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor
Adresa: mun. Chișinău, str. M.Kogălniceanu
63
Tel .: + 373 22 29 47 30

e-mail: info@ansa.gov.md
Web: <http://www.ansa.gov.md>



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations