

برنامج التعاون الفني بين وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

وزارة الزراعة
Ministry of Agriculture
المملكة العربية السعودية



منظمة
الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة



Project UTF/SAU/048/SAU

"مشروع تطوير تقنيات وإنتاجية الإستزراع السمكي البحري"

أطلس المواقع المرجحة لتربية الأحياء المائية في الأقصاص بالبحر الأحمر



جوستان ساوندرز
فرانشيسكو كارديا
محمد سعد هزاع
بهيج محمد راسم
محمد ابراهيم عتيبي
محمد باسل رفيق

برنامج التعاون الفني بين وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

وزارة الزراعة
Ministry of Agriculture
المملكة العربية السعودية



منظمة
الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة



Project UTF/SAU/048/SAU

"مشروع تطوير تقنيات وإنتاجية الإستزراع السمكي البحري "

أطلس المواقع المرجحة لتربيه الأحياء المائية في الأقاص بالبحر الأحمر

شكر وتقدير

تم إعداد وتمويل هذه الوثيقة ضمن إطار برنامج التعاون الفني بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تحت إتفاقية الأموال المودعة لمشروع تطوير تقنيات وإنتاجية الإستزراع السمكي البحري في المملكة العربية السعودية (يو تي إف / ساو / 048 / ساو).

تم إنجاز كافة الأعمال المتعلقة بإعداد الوثيقة بمعونة وإشراف خبير نظم المعلومات الفني السيد جاستين ساندرز وبالتنسيق مع مدير مشروع منظمة الأغذية والزراعة السيد فرانشيسكو كارديا وأخصائي تقنية المعلومات مساعد فني السيد محمد باسل رفيق.

كما تم إقرار وتأيد المدخلات التقنية المتعلقة بتطبيق معايير اختيار الموقع بمعرفة كل من، خبير الأقراض السمكية السيد اليساندرو شاتاليه، وخبير البيئة السيد أنتوني كورنر.

هذا إلى جانب، مساهمة أعضاء مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة في التثبت من مجموعة البيانات المنشورة بشكل كبير وفي وضع الصيغة النهائية للوثيقة بكلتا اللغتين العربية والإنجليزية.

ووفقاً للأنظمة المعمول بها أجازت حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة، على تمويل هذا النشرة.

مقدمة

تعتبر زراعة الأحياء المائية وعلى وجه الخصوص زراعة الأحياء البحريّة من أهم الصناعات المتنامية حيث تشهد حالياً توفر ما يقرب من 50% من احتياجات السوق العالمية من الأسماك. وتشير التقديرات إلى تواصل تنامي معدلات الإنتاج العالمية لتصل إلى 30 مليون طن بحلول عام 2050م بغية سد

الإنتاج، وبتضارف كل تلك العوامل مجتمعة يستحيل لزراعة الأحياء المائية أن تكتب لها الإستدامة على المدى الطويل.

من الجوانب الهامة التي يجبأخذها في الإعتبار قبل الشروع في اختيار موقع ما وبدء التشغيل، ما يتطلبه الحال عند اختيار الموقع أو المناطق المناسبة لتنشين البنية التحتية الأساسية اللازمة لزراعة الأسماك في الأقراض، مراعاة كافة الجوانب الفنية والبيئية. وفي هذا الأطلس ما يتضمن على معلومات شاملة حول مختلف الموضوعات الرئيسية من حيث ما يوفره المستخدمين من خرائط وصور ملقطة بالأقمار الصناعية التي تظهر الأماكن التي تم تحديدها وفقاً لمصادر معلوماتية موثوقة بها تتعلق بمعايير عملية اختيار الموقع الرئيسية الواقعة ضمن المياه الساحلية للمملكة العربية السعودية. هذا وتتجدر الإشارة، إلى أن القرارات المتتخذة بشأن الموقع غالباً ما تكون معددة وتحتاج إلى تحليل عميق للبيانات وللمسوحات الأرضية. فعلى سبيل المثال، موقع ما يتصف بمياه دافقة جيدة سيكون له دور في إزاحة المخلفات أو إخلال الأكسجين اللازم في الأقراض برغم كل المؤشرات الدالة على عدم صلاحيتها كونها شديدة الضحلالة. وعلى النقيض من ذلك بالنسبة للمواقع المتميزة بعمق مياهها، إلا أنها بالرغم من ذلك تتسم بضعف حركة المياه فيها. وبذلك فالموقع المختار في هذا الأطلس الذي ينبغي أن يكون بمثابة مصدر أساسى للمعلومات في اختيار موقع وعلى قدر كبير من الدقة يستلزم أن يتبعه إجراء إسحاق دقيق عن موقع الأقراض المحتملة لإعتماد اختيار الموقع المناسب الذي ينشده المستثمرون وفقاً لخطط الإنتاج، والأنواع المستهدفة والتقنيات التي يمكن إعتمادها.

قام مشروع منظمة الأغذية والزراعة UTF/SAU/048/SAU ، بإصدار أطلس بالمناطق المختارة لزراعة الأحياء المائية المتواقة مع المعايير الأساسية لإختيار الموقع وفقاً للدليل الإرشادي والمعايير الخاصة بالجوانب الفنية والبيئية لمواقع أقراض زراعة الأحياء المائية

فجوة الطلب المتامية نتيجة الإزدياد المطرد لعدد السكان العالمي. وتشير منظمة الأغذية والزراعة إلى ما سيشهده قطاع زراعة الأحياء البحريّة ومنها زراعة الأسماك البحريّة من توسيع منقطع النظير وإحتلاله لمكانة كبرى كقطاع فرعي ضمن قطاع الإنتاج السمكي من أجل تأمين الغذاء، وعلى الرغم من التناقض المحتمل على الأرضي إلا أن البيئة البحريّة ستهتم بدور فاعل في وفرة الموارد والمساحات المتاحة للتلوّس في صناعة زراعة الأحياء المائية.

يتميز التكوين الجغرافي للمملكة بساحلية الغربي والشرقي المتمثلين في كل من البحر الأحمر والخليج العربي. ومن المتوقع أن تشهد المملكة توسيعاً في مجال زراعة الأحياء المائية وبالدرجة الأولى على ساحل البحر الأحمر والذي تم على أساسه وضع المبادئ التوجيهية بالإضافة إلى معايير الإنتاج المثلث ولغيرها من التفاصيل الكثيرة، والتي روعي فيها بشكل عام العموم امكانية تطبيقها في كلا ساحلي المملكة العربية السعودية.

تعتمد عملية التوسيع والإستدامة طويلة الأجل لصناعة زراعة الأحياء المائية، على وضع وتبني أفضل الممارسات في شؤون الإدارة التشغيلية والذي يشتمل أساساً على تحديد وإختيار الموقع المناسبة لإقامة مشاريع زراعة الأحياء المائية، حيث تحديد تلك الموقع هو الهدف الذي من أجله تم فيه إعداد هذا الأطلس. فمن أولى المهام الأساسية لتأسيس أي مشروع لزراعة الأحياء المائية تلك المتعلقة بإختيار الموقع الأنسب لمزاولة العمل في مجال الزراعة السمكية. ذلك أن أي خطأ يمكن ارتكابه في مرحلة التقييم وإختيار الموقع لزراعة الأحياء المائية يمكن أن يؤثر سلباً على الجدوى الاقتصادية للموقع بدرجة كبيرة وإنعاكسها على كلفة التشغيل والقدرة على الإنتاج. كما أن تأثيراتها ستطال الحالة الصحية للأسماك أيضاً مع ارتفاع حالات التفوق الملحوظة عليها وبالتالي من تدهور

ساهمت الدراسة بقسط وافر في إصدار الأطلس، بتحديد الواقع المحتملة لتربيه الأحياء المائية في الأقصاص وبيان المناطق المحتملة لوقوع التعارضات المادية والبيئية، بشكل يمكن وزارة الزراعة من التوجيه والإرشاد عبر : (أ) مساعدة المستثمرين الحاليين منهم والمستقبليين، (ب) إيضاح إجراءات إصدار التصاريح، (ج) إبراز الإجراء الأكثر تفصيلا حول التقسيمي مثل المسوحات الميدانية وتحليل الطاقة الإستيعابية أو تقييم الأثر البيئي، و (د) اظهار أي دراسات أخرى قد تكون مطلوبة قبل إنشاء أقصاص تربية الأسماك. كما يتوقع من هذا الأطلس أيضا الفاندة العملية التي ستعود على الجهات العلمية والتعليمية المختصة، وفي صياغة خطة العمل وصنع القرار بما فيه المؤسسات التجارية.

ساحل البحر الأحمر

يقع البحر الأحمر ضمن إحداثيات 29° و 20° شمالاً و 34° و 42° شرقاً ولساحل ممتد بطول 1800 كم تقريباً اخضعت فيها مياه البحر للمملكة للتحليل ضمن مساحة تزيد رقعتها عن $50,000 \text{ كم}^2$ (شكل 1).



شكل 1: موقع البحر الأحمر

المحتملة المرتبطة بالتنمية الحضرية وأماكن تواجد الموارد الحساسة.

كما كان للمنظمة أن حددت من مدى الحاجة لبناء المزيد من القدرات في المملكة العربية السعودية بما في ذلك تأسيس نظام المعلومات الجغرافية ومجال التدريب ومواصلة الدراسة حول تحديد الواقع المحتملة لتربيه الأحياء المائية وإعداد قوائم جرد بأنشطة تربية الأحياء المائية القائمة وإستخدام البيانات المكانية للتمكن من دور وزارة الزراعة عبر تزويدها بالمعلومات الكافية عن القدرة التنموية الشاملة للقطاع، وفي هذا ما يتبع لوزارة الزراعة من تحديد الحجم بشكل صحيح وتحديد أولويات الدعم وتوجيهها نحو المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وبمجرد تأسيسها، ستتمكن وحدة نظم المعلومات الجغرافية من مساعدة المستثمرين الجدد عبر مدهم بالمعلومات المكانية لتحديد الواقع المناسب للتنمية.

من العناصر الهامة للمشروع القيام بإنشاء مرفق لنظام المعلومات الجغرافية وبناء القدرات للعاملين في مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة بتدريب الموظفين على نظم المعلومات الجغرافية والمعلومات المكانية. تم اختيار المنهجيات باستخدام نظام المعلومات الجغرافية لتوفير نهج ثابت وقوى للإلتقطة البيانات وترجمتها مع تخزينها وتحليلها حيث إشتغلت على البيانات الحديثة المتقطعة عن المناطق الساحلية والبرية الواقعة ضمن حدود المملكة العربية السعودية وخاصة ما يتعلق بالبحر الأحمر ويزراعة الأحياء المائية مع اتمام تخزين كافة البيانات المكانية في نظام المعلومات الجغرافية لاستخدامها عند إقتضاء الحاجة لذلك كجزء من التحليل في اختيار الموقع، والحصر وتقييم الطاقة الإستيعابية وفي تحديد المجالات المحتملة للتنمية. وقد تم إلتقطة مجموعات عديدة من البيانات الهامة بعد ترجمة صور الأقمار الصناعية عالية الدقة وتحميلها في نظام المعلومات الجغرافية بمركز أبحاث الثروة السمكية بجدة.

المختارة في المملكة العربية السعودية قدر الإمكان عملاً باللوائح الصادرة في المملكة العربية السعودية. هذا ولكن من إدارة المزارع السمكية بوزارة الزراعة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، أولوية التتحقق من أية أخطاء أو تضاربات حول تطبيق اللوائح التنظيمية لزراعة الأحياء المائية الصادرة من قبل الوزارة إضافة إلى التشريعات البيئية الأخرى المسنة من قبل الرئاسة العامة .

بوجه عام يمثل الأطلس دعماً مكانياً في اختيار الموقع الجيدة، مع توفير المعلومات الجغرافية المتعلقة ببعض المعايير الرئيسية المساعدة في الحد من التضاربات المحتملة فيما بين المستخدمين للأجزاء الساحلية المرتبطة بطبيعة أنشطتهم في ذلك. كما أن هذا الأطلس سيسهل للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع لتربيه المائية في الأقصاص البحرية على ساحل البحر الأحمر، من مهمة اختيارهم للأماكن الأكثر ملائمة لمشاريعهم الإستزراعية.

حالياً يتمثل دور وزارة الزراعة في مسؤوليتها لإدارة وتطوير أنشطة تربية الأحياء المائية في المملكة العربية السعودية. وفي هذا الجانب تم تنفيذ دراسة سابقة بتمويل من صندوق التنمية الزراعية وبالعمل مع وزارة الزراعة لتقدير الطاقة الإستيعابية المحتملة لتربيه الأحياء المائية في المناطق الساحلية باستخدام الأدوات المكانية (نظم المعلومات مثل الإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية)، بالإضافة إلى استخدام الخرائط الموجودة. إشتملت الدراسة التي نفذت من قبل KPMG/Poseidon وإستشاري نظام المعلومات الجغرافية منظمة الفاو، تقييم الطاقة الإستيعابية على نطاق واسع للمصايد وتحديد المناطق المحتملة لإقامة الأقصاص السمكية ولغيرها من نظم التربية من خلال دمج المعلومات البحرية والبيئية مع البنى التحتية والمرافق الأرضية المتاحة، كما تناولت الدراسة في الإعتبار النزاعات

معايير اختيار الموقع الهامة للإستزراع البحري


تعتمد خصائص الخرائط المستخدمة في تحديد وإختيار الموقع الساحلي لزراعة الأحياء البحري بالدمج ما بين استخدام صور الأقمار الصناعية والمعلومات المنشاة الخاصة (بالموائل الساحلية، والوديان وخطوط الملاحة البحرية، والبنية التحتية بما في ذلك مناطق التخطيط فضلا عن السمات الساحلية كقياس الأعماق / أعمق المياه والتضاريس الفاقعية بإستخدام نظام المعلومات الجغرافية لإجراء التحليل المكاني للبيانات المرصودة/ الطبقات لتحديد الموقع المحتملة لتربيه الأحياء المائية.

ويتأثر اختيار الموقع المناسب عموما:

- بالمتغيرات البيئية (الكيميائية - الطبيعية) المؤثرة على صلاحية الموقع لإنتاج الأسماك
- الآثار البيئية المحتملة
- البنية التحتية لإعتبارات الخدمة، و
- الحاجة إلى حماية مصالح المستخدمين الآخرين للمياه الساحلية

كما أن هناك أيضا عدد من العوامل الأكثر تحديدا والتي يستلزم أخذها في الإعتبار عند تحديد مدى مقبولية المقترنات لتطوير تربية الأحياء البحريه وتشتمل على:

- بعد المسافة عن المزارع السمكية الأخرى؛
- القرب من محميات الطبيعية بما في ذلك الشعاب المرجانية وشواطئ تعشيش السلاحف؛
- أساليب العمل المتبعه (مثل آثار الإضاعة والضوضاء المترتبة بها، وما إلى ذلك)؛
- سياق التخطيط (الخطط المحلية، أو المناطق الساحلية المخصصة) بما في ذلك مناطق تربية الأحياء المائية القائمة أو الخطط؛



شكل 2. درجات الحرارة للمياه البحرية السطحية وتركيزات الكلوروفيل أ

(أ) درجة حرارة المياه السطحية و (ب) تركيزات المياه من كلوروفيل أ (الدلالة على الإمداد بالمغذيات) والمستمدة من وكالة ناسا الفضائية، نظام البيانات على الانترنت لجيوفاني المطرور


- التأثيرات البصرية المحتملة على المشاهد الطبيعية والبحرية؛

- توفر منافذ الوصول للأراضي والبنية التحتية الازمة؛
- التأثير والقرب من الموقع الأمنية الساحلية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة أو القيود الأخرى؛
- التأثيرات المحتملة على الأماكن الترفيهية والسياحية؛ و
- التأثير على الملاحة والمصالح السمكية الأخرى.

المعايير العامة لإنتاج الأسماك البحرية

من أهم المعايير التي ينبغي النظر فيها على نطاق واسع لإختيار الموقع المحتملة الملائمة لتربيه الأحياء المائية في الأقصاف تلك المشتملة على :


درجة حرارة سطح ماء البحر. ينبغي توافر درجات الحرارة ضمن نطاق مقبول للأنواع المستزرعة، لذا كان من الأهمية بمكان جمع بيانات عنها وأخذها بعين الإعتبار لإختيار الأنواع، وذلك لتاثيرها المباشر على عمليات الأيض في الأسماك وبالتالي على إنتاج وإستهلاك الأكسجين وإنعكاسه على نشاط الأسماك وعلى تركيزات الأمونيا وثاني أكسيد الكربون. ومن حسن الحظ إتسام البحر الأحمر بدرجات حرارة مقبولة بالنسبة للكثير من أنواع الأسماك المحتمل والمفترض إستزراعها وبالتالي فهي لا تشكل عائقا عند النظر في عملية إختيار الموقع على إمتداد الشريط الساحلي بأكمله. (شكل 12)



صورة 4: ملوحة البحر الأحمر

سرعة التيارات المائية: عملية تبادل المياه عبر فتحات شبک الأقاض من الأمور الهامة لتجديد الأكسجين وإزالة المخلفات الأيضية، كما أن التيارات القوية من شأنها أن تلحق الضرر بشكل الأقاض وبالتالي من تقليص حجمها الفعلى. ويتراوح نطاق سرعة التيارات لبعض المواقع في الأجزاء الساحلية من 0 إلى 0,25 م/ ثا أثناء هبوب الرياح القوية أو بوقوعها تحت تأثير المد والجزر (Beveridge, 2004). وتختلف سرعة التيارات المائية موسميا حيث تقع تحت تأثير قوة الرياح السائدة.

حالة الطقس. وهي من أكثر الأمور التي تدعو إلى الفلق في زراعة الأسماك بواسطة الأقاض البحرية نظراً لتأثيرها



شكل 3. حالة الرياح السائدة خلال فصلي الشتاء والصيف

تركيز الملوحة. يعتبر عاملًا مهمًا بالنظر إلى ضعف مقاومة بعض أنواع الأسماك لمستويات الملوحة العالية، وهي مهمة في اختيار بعض أنواع أسماك المياه المعتدلة التي يمكن تربيتها في شمال البحر الأحمر. (شكل 4).

والمحفوظ على قرص ناسا جي اي إس، القياس الشعاعي للون المحيط بمتوسط شهري 4 كم لموديس-أكوا. تمثل الصور متوسط البيانات لدرجات الحرارة من يوليو إلى سبتمبر أو حتى أكتوبر 2011م (كلوروفيل أ، في أواخر الصيف) وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2012م (أواخر الشتاء).

تركيزات الكلوروفيل. يمكن قياس تركيز الكلوروفيل أ عن طريق صور الأقمار الصناعية وإعتبره مؤشرًا هاماً في تقدير الحالة التغذوية ونوعية المياه ومدى التلوث العضوي، كما توفر معلومات مفيدة لتولي إدارة نوعية المياه ومراقبة التلوث وبالنسبة لمستويات الكلوروفيل في مياه البحر الأحمر فهي متغيرة بين فصلي الشتاء والصيف حيث عادة ما تكون مستوياتها مرتفعة إلى الجنوب منها. (شكل 2 ب).

حالة الرياح. يتصرف البحر الأحمر بطقوسه المتقلب خلال شهور الشتاء والصيف بشكل ملحوظ ، حيث تهب الكتل الهوائية الباردة القوية عليها شمالاً مرة كل ثلاثة أيام من أواخر نوفمبر وحتى مارس وتواصل تلك الجيوب الهوائية الباردة حركتها عبر مياه خليج السويس الضيقة ومنها بإتجاه الجنوب من البحر الأحمر بسرعة ثمانية عشر عقدة . ونتيجة لذلك، تصبح الرياح السائدة شمالية إلى شمالي غربية (بمقياس 5 - 7 بوفورت تقريبا) وتنتساعد عبر خليج السويس وشمال البحر الأحمر محدثة أمواجاً بارتفاع يترواح بين 8 - 12 قدم . وتنسب الكتل الهوائية الباردة القوية إلى إزدياد سرعة الرياح بشكل إثنيني و بلوغها بقوة 8 أو 9 بوفورت ، وخاصة بالقرب من خليج السويس مع تشكيل الأمواج بارتفاع يصل إلى 10 - 15 قدم و خلال شهري أبريل ومايو ، وثنائية في سبتمبر وحتى مطلع نوفمبر ، تأخذ الكتل الهوائية الباردة في تراجع شدتها وحدوثها وهبوبها عبر شمال البحر الأحمر مرة كل 4 - 5 أيام تقريبا ولا تميل إلى الإندفاع جنوباً حيث تخبو . ومن حيث اختيار الموقع تعتبر الموقع المعرضة للرياح الأقوى أقل ملائمة. (شكل 3).

التقلبات المناخية: تتحل قضية التغير المناخي أهمية متزايدة في اختيار موقع مناسبة لتربية الأحياء المائية، بالنظر إلى التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلا.

- **ارتفاع مستوى سطح البحر:** بحسب التقرير الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يتوقع إرتفاع مستوى سطح البحر من 180 - 590 ملم بحلول عام 2100 بسبب الإحتباس الحراري العالمي وعلى نحو مماثل لما أشارت له الهيئة كشفت البحث الأخيرة ترجح إرتفاع مستوى سطح البحر للضعفين على أقل تقدير بحلول عام 2100م وسيكون لإرتفاع مستوى سطح البحر الكبير أن يؤدي إلى تعرض المناطق الساحلية ذات المستوى المنخفض لمزيد من الفيضانات مما يجب معه تواجد مزارع الريبيان على الشواطئ البحرية في مناطق لا يقل إرتفاعها عن المترتين من مستوى سطح البحر الحالي.
- **ارتفاع درجات الحرارة:** تبدي التوقعات لنماذج تغير المناخ حدوث إرتفاع في متوسط درجات الحرارة لمياه البحر ما بين 1,0 و 1,4 م بحلول عام 2050م.

النزاعات العامة المحتملة حول حقوق إنتفاع الأطراف الأخرى

نقاط إقاء النفايات وأنباب الصرف تحت المياه الساحلية: يكون من الضروري تجنب هذه النقاط وتواجد موقع تربية الأحياء البحرية على مسافة لا تقل عن الكيلومتر الواحد.

مناطق إنتشار الكابلات أو خطوط الأنابيب: وهي أيضاً مناطق يجب تجنبها وينبغي عدم نشر المراسى أو الأفواص فيها حيث (يوصى بعد عنها بمسافة 200 متر).

ومنشأة تصنيع الثلج وغيرها من المرافق. (وعلى وجه الخصوص مرافق الحضانة ومواقع إنزال الأسماك).

- الأرصفة البحرية: يستلزم توفرها بالقرب من مواقع الأفواص البحرية بأعماق كافية لإبحار القوارب المحملة بالأعلاف والأسماك بشكل آمن، وخاصة خلال ظروف الطقس القاسية.

- طوبوغرافية الساحل: ضرورة توفر المنافذ للأرصفة البحرية

المياه الإقليمية (أو البحر الإقليمي) : تعريفها بحسب إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م، هو حزام الساحل البحري الممتد لمسافة إثنا عشر ميلاً بحرياً (22 كم؛ 14 ميلاً) من الساحل (عادة محددة بمتوسط الجزر الربيعي) للدولة الساحلية. يعتبر البحر الإقليمي خاضعاً لسيادة الدولة كما هو منطبق على أراضيها وهذا ينطبق على مجالها الجوي فوق البحر وقاعه.

وبحكم طبيعة البحر الأحمر المتميز بعمق مياهه نسبياً حيث المناطق المتضمنة على أعماق مناسبة للأفواص تقع في معظمها في المناطق الشاطئية ضمن المياه الإقليمية.

منطقة إقتصادية خالصة. في إطار إتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982م بشأن قانون البحار، تم تعريف المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة حقوقاً خاصة في الإستغلال وإستخدام مورادها البحرية والممتدة إلى مسافة 200 ميل بحري، وفي حال ضيق إتساع المسطح المائي بين الدولتين لأقل من 400 ميل بحري عرضاً فإن خط المنتصف يمثل الحدود الإقتصادية الخالصة بينهما. وبذلك فحدود المنطقة الإقتصادية الخالصة للمملكة على البحر الأحمر تمتد إلى أسفل بإتجاه منتصف البحر.

الكبير على عملية اختيار الأفواص من حيث التصميم والمتانة لأجزائها (الشباك، ومعدات التوثيق) وعلى كل ما يتعلق بالجوانب التشغيلية للمزرعة أيضاً.

وهناك أربعة عوامل مؤثرة على تشكل الموجات البحرية:

- سرعة الرياح
- المسافة للياه المفتوحة المعرضة لهبوب الرياح (لجلب الأمواج)
- إتساع نطاق دائرة المنطقة المتأثرة بالأمواج المجلوبة
- المدة الزمنية لهبوب الرياح على منطقة معينة حيث تساهم كل هذه العوامل معاً في تحديد حجم موجات الرياح، فتعاظم أي من تلك العوامل تكون مدعمة إلى تشكيل موجات بحرية أكبر.

واجهة الموقع: تعد الموقع المحمية بمنأى عن الرياح القوية السائنة أو إتجاه حركة الأمواج عملاً مهماً ذلك أن الكثير من الأجزاء الساحلية للبحر الأحمر عرضة لتأثير الأمواج، ولكن في الوقت ذاته هناك العديد من المناطق التي يمكن إقامة الأفواص البحرية فيها بفضل تكوينات الشعب المرجانية الخارجية المتاخمة لها.

البنية التحتية: تقتضي زراعة الأحياء المائية إلى توفير البنية التحتية الأساسية لبناء المرافق، التشغيل، وصيانة وتسويق المنتج:

- الطرق: يستلزم توفر الخطوط الجوية القريبة التي تسهل من حركة تأمين لوازم التشغيل، والموظفين وإسلام وتسليم شحنات الإنتاج من الأسماك من الموقع.

- الكهرباء: وجوب توفير مصادر إمداد بالكهرباء قريبة من الموقع لتشغيل المضخات، المكاتب الإدارية والتكييف

القوارب الترفيهية والغوص: وهي من الأماكن الهامة لليخوت أو الصيد أو موقع حطام السفن أو الشعاب المرجانية والتي تحتاج إلى تحديدها رسمياً.

مناطق الصيد التقليدية: وهي من المناطق التي يمكن نشوب نزاعات فيها مع قطاع المصايد جراء التناقض على مناطق الصيد التقليدية، وبالتالي ينبغي تجنب إقامة مشاريع لتربية الأسماك في الأفواص البحرية في تلك المناطق المستثمرة من قبل مجتمعات الصيد المحلية، ومن شأن تقييد وصول الصياديين لتلك المناطق أن يولد نزاعات ما بين قطاع المصايد والمستزرعين، ولتجنب مثل تلك النزاعات المحتملة فالأمر يستدعي حاجة توصل كلا القطاعين إلى اتفاق حول تقسيم المناطق.

مواطن الحضانة ووضع البيض للأسماك: تعتبر موائل نباتات الشورى والشعاب المرجانية ومروج الأعشاب البحرية تحت الماء مناطق حيوية لتكاثر الأنواع المحلية من الأسماك، وبالتالي وجوب تجنب وقوع الأفواص السمكية بالقرب منها لتأثيرها السلبي المحتمل على سلوك الأسماك في الطبيعة، أو في حالة حدوث هروب ملحوظ لأنواع المفترسة بما يشكل تهديداً لجموع الأحياء اليافعة وبالتالي يستحسن إقامة الأفواص السمكية بعيداً عن مواطن الحضانة ووضع البيض المعروفة.

مناطق الموانئ أو البني التحتية البحرية: يجب تجنب إرساء الأفواص السمكية داخل الميناء أو بالقرب من مدخل الميناء الخارجي، وفي ذلك ما يسمح من المناورة الآمنة للسفن والقوارب أثناء حركة الدخول والخروج وعلى سلطات الموانئ أن تشير إلى المنطقة العازلة المحظورة وفقاً لطبيعة حركة السفن والقوارب المستخدمة لموانئها.

شواطئ تكاثر السلاحف: يمكن لموقع تربية الأسماك البحرية أن تشكل مصدر إزعاج للسلاحف أثناء تحضين بيوضها بفعل

مناطق رسو السفن: غالباً ما تقع هذه المناطق في محيط الموانئ والمضايق البحرية أو المناطق الصناعية حيث تستخدم كمراسي في وضع الجاهزية لتنظيم تدفق حركة المرور البحرية والسفن في حالة الانتظار للسماح لها بالإرساء، والتي عادة ما يشار إليها في الخرائط البحرية وبالتالي لا يمكن شغلها بالأفواص السمكية، ويصبح من المستحسن وجود منطقة عازلة تبعد مسافة 500 م عن مناطق إرساء السفن.

المناطق العسكرية الهامة: تتمثل في المرارات الملاحية أو ميادين الرماية في المناطق البحرية بشكل يتغذى معه إقامة مواقع لمشاريع زراعة الأسماك البحرية في الأفواص، ويكون من المستحسن وجود منطقة عازلة تفصلها عن تلك المناطق بمسافة 5 كم.

حدود المحافظات: يتم منح تراخيص تربية الأحياء المائية ضمن دائرة النطاق الإداري للمحافظة أو الأمانات وفي حدود الصالحيات الممنوحة لها تجاه المسطحات المائية. لذلك يستوجب وجود موقع مشاريع زراعة الأسماك البحرية في الأفواص ضمن المنطقة الإدارية التابعة للمحافظة بعيداً عن الحدود الإقليمية للمحافظات أو الأمانات لتلافي نشوب الخلافات فيما بينها على الصالحيات.

المناطق الحدودية الوطنية: تعتبر من المواقع الأمنية الحساسة، لذلك وجوب تواجد مواقع زراعة الأحياء المائية بعيداً عن هذه المناطق.

الموانئ وأحواض إصلاح السفن: يمكن أن تشكل الموانئ أو أحواض إصلاح السفن تعارضاً مع نشاط الأفواص البحرية نظراً للمرارات الملاحية الضرورية لتأمين حركة الدخول والخروج للقوارب، مما يستدعي معه توافر منطقة عازلة بمسافة لا تقل عن 500 متر.

الأماكن السياحية الهامة: على الرغم من عدم التطور الكبير للسياحة على ساحل البحر الأحمر والمتمثلة في الأماكن السياحية المجاورة للأحياء السكنية ضمن المناطق العمرانية الكبيرة لقضاء العطلات الموسمية، فإن من شأن تداخلها مع نشاط تربية الأحياء المائية أن تولد عنها نزاعات وخلافات حول أحقيّة الإستفادة من الأرض والمياه التي تعتمد عليها مرافق التربية. وينبغي عند اختيار الموقع لإقامة مزرعة سمكية الأخذ بعين الاعتبار احتياجات السياح بتواجدها بعيداً بمسافة لا تقل عن 3 كيلومترات من الفنادق السياحية والشواطئ.

الأماكن الأثرية الهامة: وهي من الأماكن التي يجب تجنبها لتفادي إلحاق الضرر بها بفعل المراسي تحت الماء أو بسبب الإنشاءات القائمة على الأرض.

المناطق الحضرية: الإحتمالات واردة بدرجة كبيرة لنشوب نزاعات بين السكان ومشاريع تربية الأحياء المائية ضمن المناطق السكنية على المدن الساحلية لإعتبارات تتعلق بخصوصية والمحافظة على المشهد العام بعيداً عن التشويه وبالتالي يستحسن إقامة منطقة عازلة بمسافة 3 كم تفصل بين المناطق الحضرية ومواقع مشاريع الأفواص السمكية، حيث تشهد المناطق الساحلية للمملكة تنمية حضرية سريعة بالتوازي في المدن الساحلية، لذا يوصى بتقسيم المناطق بشكل ما عند التخطيط.

صرف النفايات الصناعية والزراعية والمنزلية: وهو أحد أشكال الملوثات المائية التي يمكن لها أن تشكل تهديداً لحياة ونمو الأسماك. ويستوجب الحال إلى تواجد الموقع المرخصة المخصصة لمشاريع بعيداً بمسافة مناسبة بمنأى عن صرف النفايات السائلة (المنطقة العازلة المقترنة هي 500 م).

البيئي، ومن شأن تثبيت المراسي في مياه يزيد عمقها عن 80 متراً أن تعرّض من مهمة الفحص والصيانة من قبل الغواصين.

حالياً يفترض تراوح نطاق الأعماق الملائمة للأفواص البحرية في البحر الأحمر بين 25م إلى 50م و 50م إلى 80م بحسب نوع الأفواص التي يجري النظر فيها.



شكل 6: خريطة كنورية بالأعماق بالقياس المترى.

تم رصد بيانات قياس الأعماق باستخدام مصادر معلوماتية مختلفة قائمة على:

- الرصد الرقمي لخريطة القوافل البحرية (خرائط ملاحية تشغيلية).

- تحليل صور الأقمار الصناعية وتحليل لأعماق تتراوح بين 0 و 5 أمتار حيث تظهر تكوينات الشعاب المرجانية والرمال.

الأودية (الأنهار): برغم غياب السيوول الجارية للأودية طوال العام، إلا أن ذلك لا يمنع من حدوث ارتفاع في منسوب المياه العذبة العابرة خلالها أحياناً وهي:

- إحداث تغيرات في درجة حرارة المياه والعكارة
- إحداث تغيرات في الملوحة مع تشكيل الطبقات الحرارية في عمود الماء

مفتاح المصطلحات

Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المواقع المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة الافتراضي 1 كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	الموائل المرجانية الافتراضية 500م
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشوري
Mangrove Buffer 500m	حدود موئل نباتات الشوري الافتراضية 500م
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية الافتراضية 1كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الافتراضية لساحل البحر الأحمر 500م
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة ال العربية السعودية والجزر
Depth	عمق
25 to 50m	إلى 50م
50 to 80m	إلى 80م

شكل 5: مفتاح المصطلحات الأطلسي الخاص بالسمات المستخدمة كجزء في عملية اختيار الموقع

قياس الأعماق (عمق المياه) : يعتبر من أهم المعايير المستخدمة والمرجحة في تحديد مواقع الأفواص البحرية بسبب دورها المؤثر في:

- عملية تشتت الجسيمات العالقة
- تبادل المياه
- التمكن من استخدام شبک أعمق طولاً وبالتالي تأمين الحصول على مياه عالية في جودتها وأكثر استقراراً في درجة حرارتها.

بصفة عامة، يجب تثبيت الأفواص البحرية في أعماق مساحة ممكنة ضمن الموقع المتواجهة في مياه يزيد عمقها عن 25م، بهدف توفير أقصى درجات الأمان ولأدنى حد من الآثار الإضاءة والضوضاء وحركة القوارب، إضافة ما للبناء والمرافق المشيدة على الشاطئ المساعدة في عملية إدارة وتشغيل الأفواص السكنية من إزعام محتمل على السلاحف والتسبب في تدهور بيئتها من خلال عمليات الهدم وإلحاق أضرار مادية بأماكن تعشيشها على الشواطئ، وبالتالي يقترح إمتداد المنطقة العازلة مسافة كيلومتر واحد كحد فاصل بينهما.

المعايير الرئيسية المستخدمة في الأطلس لإختيار المناطق المناسبة لتربية الأحياء المائية في الأفواص

تم تحديد معظم المعايير الرئيسية المستخدمة في تحديد المناطق الوعادة لتنمية تربية الأحياء المائية وفقاً لأهميتها وصلتها وبحسب البيانات المتاحة محلياً. ومن حسن الحظ أن إعتمد المشروع على استخدام صور الأقمار الصناعية الحديثة والحصول على غيرها من البيانات المتوفرة والموثوقة حيث أصبح بالإمكان استخدام نظام المعلومات الجغرافية بيسر في تحديد الموقع المختار المناسبة لتربية الأحياء المائية، وتتجدر الإشارة إلى أنه بحيازة هذا الأطلس الخاص بتربية الأحياء المائية فإن الخطوة التالية في اختيار الموقع سيرتكز على إجراء مسح مفصل بالموقع الواقع ضمن المناطق العامة المشار لها في هذا الأطلس.

المقترحه) لا يعاقب عليها النظام من قيام مشاريع الأقفال السمسكية بها. وللحذر من أي تهديد قد يلحق بالمناطق المحمية، يستلزم الحال ضرورة مراعاة ترك مسافة فاصلة لا تقل عن كيلومتر واحد.


ترتکز مجموعة البيانات للمناطق البحرية المحمية الموضوعة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في الغالب على بيانات تحديد الموقع وتوزيعها في صيغة نظام المعلومات الجغرافية.

الموائل الحساسة والأنواع البحرية: ينبغي تولية المناطق ذات القيمة المميزة بكثير من الإهتمام من حيث الحماية خصوصاً المناطق البحرية المحمية، والمحميات الطبيعية، والمناطق المأهولة بأسراط الطيور الهمة، والأراضي المغمورة ذات الأهمية كما هو الحال بالنسبة إلى موائل الطيور المائية وشواطئ التعيش للسلاحف.

الشوري: تتصف مناطق نباتات الشوري بتأمين الحماية الطبيعية للسواحل وكمواطن لحضانة الأحياء البحرية وتوفير الغذاء لها، وبالتالي يس怒ج الأمر حماية تلك المناطق من إقامة مرافق إنتاج الريبيان فيها كالبرك التي ينبغي إنشاءها بعيداً عن مناطق تواجد نباتات الشوري بمسافة كافية لا تقل عن 500م.



عن تلك المسالك الملاحية بمسافة مناسبة حتى الكيلومتر الواحد.



شكل 8: الخطوط الملاحية المتيسرة على موقع الشبكة الإلكترونية www.marinetraffic.com

وقد تم تطوير البيانات الخاصة بخطوط الملاحة باستخدام الخرائط المعتمدة على سجلات رصد حركة الكثافة الملاحية في البحر الأحمر المتاحة على شبكة الإنترنت (www.marinetraffic.com) ، حيث تم تحويلها لبيانات رقمية في نظم المعلومات الجغرافية وحددت المنطقة الفاصلة بمسافة كيلومتر واحد.

المحميات الطبيعية: هناك ثلاثة مناطق بحرية محمية بموجب أحكام القانون على طول ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض مناطق حساسة بينها تم تحديدها من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة كمناطق مقتربة؛ وبالتالي يجب توخي الحذر حيال أي شكل من أشكال التنمية لتربية الأحياء المائية في هذه المناطق الحساسة بينها على الرغم من أن كل المناطق المحمية التي تم النظر فيها ضمن هذا الأطلس بما فيه الواقع المحتملة المستنيرة منها، فقد يكون من الممكن إعادة النظر في الموقع إذا ما كانت (المواقع

- جلب المواد المنجرفة إلى أسفل الوادي ومنها إلى كتلة الماء ووصولها إلى الشباك حيث تكون محملة بالأشجار والأخشاب والأجسام الكبيرة الطافية. لذلك ومنعاً لأي تقييد يمكن له أن ينجم بسبب تأثير سيول الوادي، فالحال يستوجب وقوع مشاريع الأقفال السمسكية المرخصة بعيداً عن نهايات مصبات الأودية بمسافة كافية لا تقل عن 500 م.



شكل 7: يمكن أن تشكل الأودية أثراً مدمرة خاصة خلال هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات الجارفة.

تستند البيانات في رصد تشكيلات سيول الأودية على التحليل الرقمي الجغرافي اليدوي لصور الأقمار الصناعية بدقة تصل إلى 50 م.

خطوط الملاحة: يمكن للسفن الكبيرة (ناقلات النفط، سفن الرحلات البحرية السياحية، والشحن، وغيرها) السالكة لنقط العبور لخطوط الملاحة، أن تفضي إلى الإخلال من نشاط الإنتاج السمسكي من حيث الأمواج الناشئة عن حركة السفن بفعل تأثير المحركات وضجيج المراوح، وما إلى ذلك، لذلك ومن أجل السلامة ولأسباب تتعلق بحماية الإنتاج، كان من الضروري تحديد الموقع المرخصة للأقفال السمسكية بعيداً

مفتاح بالمصطلحات

Aquaculture	برية الأحياء العالمية
Producer	
Working	
Under the Licensing	
Not working	
Stopped	
Fish Landing Sites	
Coastguard Stations	
5 km distance from coastline	
10 km distance from coastline	
20 km distance from coastline	
Existing Cages	
Potential Aquaculture areas	

شكل 12: رموز توضيحية بالأطلس تبين الطبقات البيانية الأخرى المستخدمة كجزء من عملية اختيار الموقع.

الموقع الفاصلة بما يسمح من الإمتداد في منطقة الحماية بالتوسيع لمسافة 500 م.

المنشآت الصناعية/ محطات التحلية: ينجم عن محطات التحلية صرف مياه رجع أكثر ارتفاعاً في ملوحتها وحرارتها عن مياه البحر المحيطة، وفي ذلك ما يفضي لمشاكل جمة تؤثر سلباً على عمليات الإنتاج السمكي، وبالتالي يكون من المستحسن وجود منطقة فاصلة تبعد مسافة كيلومتر واحد عن موقع تواجد تلك المحطات.



شكل 11: محطة لتحلية المياه بالقرب من جدة

تم الإعتماد في رصد بيانات الموقع الصناعية على مصادر المعلومات المتوفرة من قبل شركة أرامكو السعودية بما فيه مصافي النفط ومحطات تحلية المياه ولغيرهما من الموقع الصناعية الأخرى المعروفة.

شكل 9: تعتبر نباتات الشورى مواطن بيئية حساسة يستوجب حمايتها.

بإمكان رصد نباتات الشورى ومشاهدتها بسهولة عبر صور الأقمار الصناعية عالية الدقة (مقياس كويك بيرد بدقة 50 سم) وتصنيفها ضمن بيانات كمضلعات شكلية، مع إضافة مزيد من الحدود الفاصلة في تصنيف الشورى البالغة مسافة 500 م.

الشعاب المرجانية: بإمكان المواد الصلبة العالقة عن المخلفات الإخراجية للأسماك المستزرعة والمخلفات الغذائية بالنسبة للأقاضيس البحرية القريبة جداً من تكوينات الشعاب المرجانية أن تستقر فيها مؤدية إلى اختناقها، لذا يكون من المستحسن وجوب ترك مسافة فاصلة بين حافة موقع الأقاضيس السمكية وقمة الشعاب المرجانية لأكثر من 500 م، وبذلك يتم إستبعاد مواطن الشعاب المرجانية بما فيه المنطقة الفاصلة من حالة التخصيص كموقع محتملة لتربية الأحياء المائية.



شكل 10: مواطن الشعاب المرجانية كموقع حساسة بيئية يستوجب حمايتها.

تم ترجمة البيانات المحرزة عن الموائل المرجانية أيضاً من صور الأقمار الصناعية الملقطة عالية الدقة بما في ذلك



شكل 13. أحد قوارب الخدمة المحملة بالمؤن وحوائط الصيانة
المبحرة في أغلب الأوقات لمسافات طويلة.

المنهجية المستخدمة في تحديد موقع تربية الأحياء المائية المتحتملة

تم تحديد المنهجية بما ي العمل على توفير نهج ثابت ومتين يقوم على استخدام نظام المعلومات الجغرافية في جمع البيانات وتحليلها وحفظها، يشتمل على إلتقاط البيانات الحديثة الخاصة بالسواحل واليابسة على امتداد ساحل البحر الأحمر ضمن الجدول الزمني للمشروع وبمقاييس رسم مناسب لتنفيذ دراسة اختيار الموقع، مع تخزين كافة البيانات المكانية في نظام المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة وإستخدامها عند إقتضاء الحاجة لذلك كجزء من عملية اختيار الموقع وفي عملية تحديد الموقع المحتملة للتنمية، وقد تم إلتقاط ورصد العديد من البيانات الهامة المستقاة من تحليل وقراءة صور الأقمار الصناعية الملتقطة.

يعتبر هذا الأطلس نتاج تحليل نظام المعلومات الجغرافية ينحصر الهدف منه إبراز المناطق المناسبة للزراعة السمكية في الأقاصص البحرية وفقاً للمعايير المقرة من قبل الخبراء في مجال زراعة الأحياء المائية والبيئة ومدير المشروع UTF/SAU/048/SAU، والذي يستنبط فيه إستناداً إلى

مراكز سلاح الحدود: تعتبر هذه المراكز الواقعة بالقرب من الأرصفة البحرية المساهمة في خدمة صناعة الزراعة السمكية، نقاط مثالية لأسباب تتعلق بالسلامة، وفي حال عدم توفر مراكز لسلاح الحدود قريبة، فإنه يوصى بإقامة مراكز صغيرة لها مجاورة للأرصفة البحرية.

تولت وزارة الزراعة عملية وضع الإحداثيات الجغرافية وهي متاحة بعد أن تم التتحقق منها من خلال تحليل وقراءة صور الأقمار الصناعية.

البعد عن الشاطئ: هناك دواعي قانونية عده وإعتبارات تشغيلية تتعلق بالمسافة القصوى بالأماكن التي يمكن إقامة الأقاصص السمكية فيها بعيداً عن الشاطئ.

- نطاق الإمتداد التشغيلي. تتطلب الأقاصص البحرية للخدمات التشغيلية اليومية المتمثلة في إمداد الأسماك المستتريرة بالاعلاف والقيام بمخالف الأنشطة المتعلقة بالغذية والتربية، تغيير واستبدال الشباك ونقل الحصاد إلى الشاطئ. ومن شأن وقوع الأقاصص السمكية بعيداً عن الشاطئ، ما لم يكن هناك منصة بحرية دائمة التواجد في البحر، أن تؤدي لمواجهة صعوبات تشغيلية ولو جستية أثناء تسيير رحلات القوارب حيث وذهبها ومن ثم ينبغي الأخذ بذلك في الحسبان عند التقييم والتغير في حال وقوع الأماكن المرخصة بعيداً لمسافة تخطى 10 كم.

- الموقع البحري (خارج نطاق الروبية). يمكن لها أن تخل بالمنظر العام في حال وقوعها بمواجهة المناطق الحضرية ولمرتادي المرافق السياحية أثناء العطل الأسبوعية والسنوية، ولو جودها بمنأى عن الانظار دور في تقليل الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الأطراف المختلفة.

الخرايط مزودة بخطوط نقطية كمؤشر لنطاق مسافات بامتداد 5 كم، 10 كم و 20 كم عن الشريط الساحلي.

النزاعات العامة المحتملة مع مزارع تربية الأحياء المائية الأخرى

يحدث وأن يتعرض محيط الأقاصص السمكية للإصابة بمستويات مرتفعة من البكتيريا الممرضة وإنعكاس تأثيره وبالتالي على نوعية المياه أيضاً وإنمكانية تسببها بمشاكل للمزارع المتقاسمة في استخدامها لتلك المياه، وما يداهم ذلك من مخاطر إنتقال الأمراض فيما بينها ما لم يتم الفصل بينها بمسافة كافية.


مزارع الأقاصص السمكية الأخرى: يجب أن تكون هناك منطقة فاصلة بمسافة 6 كيلومترات بين موقع الأقاصص المرخصة الفردية.

المداخل المائية لمزارع الربيبان / الأسماك القائمة والمفارخ: ينبغي تأمين منطقة فاصلة بين الموقع المرخصة لمزارع الأقاصص السمكية وبين نقاط الإمداد المائية لمزارع الربيبان أو الأسماك أو مفارخ الربيبان (المقترح 3 كم).

تضمن الخرائط على معلومات بمواقع مزارع الأحياء المائية الأخرى بغرض التيسير على المستخدمين من عملية اختيارهم للموقع.


تولت وزارة الزراعة وضع الإحداثيات الجغرافية لموقع زراعة الأحياء المائية والتحقق منها عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية أو عبر وسائل المسح الميداني المباشر لها.

موقع إنزال المصيد: تسهم موقع إنزال المصيد القائمة على توفير الأماكن المثالية المحتملة ل التربية الأحياء المائية بإعتبارها مواقع لأرصفة بحرية قائمة مسبقاً و غالباً ما يمكن التوسع فيها بشكل إقتصادي عوضاً عن حاجة اللجوء لإنشاء مرافق جديدة. وتولت وزارة الزراعة عملية وضع الإحداثيات الجغرافية بحيث أصبحت متيسرة بعد التتحقق منها من خلال تحليل وترجمة صور الأقمار الصناعية.



شكل 15: المسافة النموذجية الفاصلة عن الموقع المجاورة

تتمثل في إعتماد تقنيات معايرة، وكذلك أيضاً بالنسبة لخط الإنتاج والأنواع المستهدفة.



شكل 14: رسم توضيحي لموقع تشكيلة الأقفاص النموذجي لزراعة الأسماك البحرية في البحر الأحمر.

الاعتبارات القياسية بغرض التدليل إلى إمكانية إقامة مزرعة س מקية نموذجية ضمن تشكيلة مؤلفة من 20 قفصاً تشغّل حيزاً بأبعاد $800 \text{m} \times 480 \text{m}$ ولأعماق نموذجية بواقع 35م ضمن مجمع واحد بمساحة $\text{km}^2 (1000 \times 1000 \text{m})$ (شكل 12)؛ على أن تكون المسافات الفاصلة فيما بين المجمعات المتجلوبة بواقع 3 كم، حيث روعي في وضع هذه المعايير الإعتبارية بشكل يمكن معه إجراء تقييم واسع لعدد من المواقع بما يفسح من مجال النزوح بمزارع الأقفاص القياسية إلى أماكن أكثر ملائمة. وفي حال أن إعتمد سيناريو تشكيلة الأقفاص والموقع تلك بالنسبة للبحر الأحمر، فعندن الإحتمالات قائمة لتوفّر موقع تفوق في عددها الستمائة موقع، وفي حال أن قدر إنحصر الموقع المحددة المناسبة على الثلث ضمن السيناريو المذكور، فسيكون بالإمكان تحقيق إنتاجية قدرها 160,000 طن من الأسماك الزعنفية سنوياً (بحسب 200 موقع $\times 800$ طن / موقع) وفقاً للعمل بالتصميمات القياسية كما هو موضح أدناه مع التحفظ الشديد في تقديرات الإنتاج.

اعتبارات التصميم القياسية

عدد الأقفاص	= 20
قطر القفص	= 22 م
عمق الشبكة	= 10م
حجم الشبكة	= 3800 م ³
متوسط الإنتاج	= 13 كجم/م ³
الإنتاجية القصوى / قفص	= 50 طن
الإنتاجية القصوى / موقع	= 800 طن



يتمثل الجزء الأبرز في هذا الجانب على إعتماد التشكيلة القياسية بهدف التوسيع في تنفيذ الطاقة الإنتاجية الكلية للموقع المناسبة التي تم تحديدها لمشاريع الزراعة السمكية بما فيه المشاريع المستقلة المحتمل إختلاف مضمونها من حيث الإنشاء والشكل والحجم والتصميم وفقاً لخصائص معينة

فهرس الخريطة

يتضمن الأطلس على 36 صفحة لخرائط بمقاييس رسم 1 :
إعتماداً على طباعة ورقية بحجم A3 . 200,000




شكل 16: فهرس الخريطة



Legend	مفتاح الخريطة
.....	الطرق
—	ساحل البحر الأحمر
—	فياس الأعمان
[Protected Areas]	المناطق المحمية
[Navigation routes with 1km buffer]	خط الملاحة الملاحة 1 كم
Orange	موائل فرجانية
Orange	موائل المرجانية
500m Buffer	الافتراضية 500م
[Mangrove Habitat]	موائل نباتات
[Mangrove Buffer 500m]	الافتراضية 500م
[Wadi]	وادي
[Industrial Sites Buffer 1km]	الافتراضية 1 كم
[Red Sea Coastline 500m Buffer]	الحدود الفاصلية للساحل البحر الأحمر 500م
[KSA Regions and Islands]	مناطق المملكة ال العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	25 إلى 50 م
50 to 80m	50 إلى 80 م

ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE - RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

أطلس المناطق المرجحة لتربيه الأحياء المائية بنظام الأقاضي العائمة - البحر الأحمر - المملكة العربية السعودية




STANDARD CONSIDERATIONS


N° cages	= 20	عدد الأقباض
Cage diameter	= 22mt	قطر الأقباض
Net Depth	= 10mt	مياني العمق
Net Volume	= 3800m ³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m ³	متوسط الانتاج
Tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في القفص
Tot prod./site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في السوق

Estimated Sites of the above considerations = 0



مواقع المقدرة للاعتبارات أعلاه = 0

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	الم المنتج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	منطقة إنزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقاضي قائمة
Potential Aquaculture areas	مواقع مرجحة للاستزراع





Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة ١ كم
Coral Habitat	موطن المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	الموطئ المرجانية ٥٠٠ متر
Mangrove Habitat	موطن نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجرة القابلة ٥٠٠ متر
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر ٥٠٠ متر
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ م
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ م



STANDARD CONSIDERATIONS:

N° cages	= 25	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22m	قطر الأقفا
Net Depth	= 10m	عمق الغط
Net Volume	= 5800m³	حجم الغط
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسط إنتاج
target/cage	= 50 tons	أهداف في الأقفا
tot prod./site	= 800 tons	إجمالي إنتاج في الموقع



Estimated Sites of the above considerations = 5

لمواقع المقدرة للاعتبارات أعلاه = 5

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المصن
Working	المعمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	مطافئ إفراج
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	مواقع مرخصة للاستزراع

2.5 0 2.5 5 km






ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE - RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

أطلس المناطق المرجحة لتربيه الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة - البحر الأحمر - المملكة العربية السعودية

35°15'0"

35°30'0"





STANDARD CONSIDERATIONS الاعتبارات القياسية



N° cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22mt	قطر الأقفاص
Net Depth	= 10mt	مياني العمق
Net Volume	= 3800m ³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m ³	متوسط الإنتاج
Tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في القفص
Tot prod./site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في السوق

Estimated Sites of the above considerations = 10


لماواع المقدرة للاعتبارات أعلاه = 10

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المنتج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	منطقة إنزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	مواقع مرجحة للاستزراع





Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline —	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry —	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة ١ كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	المواطن المرجانية ٥٠٠ متر
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشورف
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشورف القابلة ٥٠٠ متر
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر ٥٠٠ متر
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ م
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ م




STANDARD CONSIDERATIONS: الاعتبارات القياسية



N° Cages	= 25	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22m	قطر الأقفاص
Net Depth	= 10m	عمق الغطاء
Net Volume	= 5800m³	الحجم السعفي
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسطة الكثافة
tot prod./cage	= 50 tons	إنتاج كل أقفاص
tot prod./site	= 300 tons	إنتاج الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 25

مواقع المقترنة للأعتبارات أعلاه = 25

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المنتج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقف
Fish Landing Sites	مطافئ ابراج
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	مواقع مرخصة للإستزراع







Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة المواصل ١ كم
Coral Habitat	موطى المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	الموطى المرجانية ٥٠٠ متر
Mangrove Habitat	موطى نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حزام موطى نباتات الشجر القابلة ٥٠٠ متر
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية المواصل ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحزام القابلة لساحل البحر الأحمر ٥٠٠ متر
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ م
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ م

ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE - RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

أطلس المناطق المرجحة لتربيه الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة - البحر الأحمر - المملكة العربية السعودية

36°0'0"

36°15'0"




STANDARD CONSIDERATIONS:


N° cages	= 20	= 20
Cage diameter	= 22m	= 22م
Net Depth	= 10m	= 10م
Net Volume	= 3800m³	= 3800م³
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	= 13كجم³
target cage	= 50 tons	= 50 طن
Total prod./site	= 800 tons	= 800 طن

Estimated Sites of the above considerations = 26

مواقع المقترنة للإعتبارات أعلاه = 26


Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	
Working	
Under the Licensing	
Not working	
Stopped	
Fish Landing Sites	
Coastguard Stations	
5 km distance from coastline	
10 km distance from coastline	
20 km distance from coastline	
Existing Cages	
Potential Aquaculture areas	





Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة المائل ١ كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	موائل المرجانية المسافة ٥٠٠ م
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجر المائلة ٥٠٠ م
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية المائلة ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر ٥٠٠ م
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة ال العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠

36°15'0"




STANDARD CONSIDERATIONS:



N° cages	= 20	= 20
Cage diameter	= 22m	= 22م
Net Depth	= 10m	= 10م
Net Volume	= 5800m³	= 5800م³
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	= 13كجم/م³
Total prod./cage	= 50 tons	= 50 طن
Total prod./site	= 800 tons	= 800 طن

Estimated Sites of the above considerations = 9


لمواقع المقدرة للأعتبارات أعلاه = 9

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	
Working	
Under the Licensing	
Not working	
Stopped	
Fish Landing Sites	
Coastguard Stations	
5 km distance from coastline	
10 km distance from coastline	
20 km distance from coastline	
Existing Cages	
Potential Aquaculture areas	





Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	فيراس الأعمان
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة المائل 1 كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	موائل المرجانية الداخلة 500 م
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجر الداخلية 500 م
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية المائلة 1 كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر 500 م
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة ال العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	25 إلى 50 م
50 to 80m	50 إلى 80 م




STANDARD CONSIDERATIONS:



N° cages	= 25	مساحة الأقفاص
Cage diameter	= 22m	قطر الأقفص
Net Depth	= 10m	عمق الغطس
Net Volume	= 5800m³	الحجم التام
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسطة الكثافة
tot prod./cage	= 50 tons	إنتاج كل أقفع = 50 طن
tot prod./site	= 800 tons	إنتاج الموقع = 800 طن



Estimated Sites of the above
considerations = 18

مواقع المقترنة للاعتبارات أعلاه = 18

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المتنج
Working	المعمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	مناطق إنزال
Coastguard Stations	مراكز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	موقع مرجحة للإستئناف







STANDARD CONSIDERATIONS: انتشارات الاعتبارات



N° cages	= 25	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22m	قطر الأقفص
Net Depth	= 10m	عمق الغطس
Net Volume	= 5800m³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسطة الكثافة
tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي إنتاج كل أقفال
tot prod./site	= 800 tons	إجمالي إنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 4

لماواطن المقترنة للاعتبارات أعلاه = 4

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	
Working	
Under the Licensing	
Not working	
Stopped	
Fish Landing Sites	
Coastguard Stations	
5 km distance from coastline	
10 km distance from coastline	
20 km distance from coastline	
Existing Cages	
Potential Aquaculture areas	






Legend	مفتاح الخريطة
Roads	طرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	نباس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة الماء ١ كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	الموائل المرجانية الماء ٥٠٠ متر
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشوي
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشوي الماء ٥٠٠ متر
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية الماء ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الساحل البحر الأحمر ٥٠٠ متر
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ متر
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ متر

© مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة
© JFRC Jeddah Fisheries Research Center

ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE - RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

أطلس المناطق المرجحة لتربيه الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة - البحر الأحمر - المملكة العربية السعودية

36°45'0" 37°0'0" 37°15'0"



STANDARD CONSIDERATIONS

	الاعتبارات القياسية
N° cages	= 20
Cage diameter	= 22m
Net Depth	= 10m
Net Volume	= 5800m³
Prod. Average Con.	= 13kg/m³
tot prod./cage	= 50 tons
tot prod./site	= 800 tons

Estimated Sites of the above considerations = 17


مواقع المقترنة للاعتبارات اعلاه = 17


Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المصنع
Working	المعمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	محلية إفراج
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	موقع مرجحة للاستزراع


2.5 0 2.5 5 km

* مركز أبحاث الثروة السمكية

© JFRC Jeddah Fisheries Research Center








STANDARD CONSIDERATIONS الاعتبارات الأساسية



N° cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22mt	قطر الأقفاص
Net Depth	= 10mt	مياني العمق
Net Volume	= 3800m ³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m ³	متوسط الإنتاج
Tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في القفص
Tot prod./site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 19


موقع المقدرة للاعتبارات أعلاه = 19

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المُنتج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	منطقة إنزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	موقع مرجحة لاستزراع





Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة المائل ١ كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	المواطن المرجانية المسافة ٥٠٠ م
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجر المائلة ٥٠٠ م
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية المائلة ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل ٥٠٠ م
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة ال العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ م
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ م






STANDARD CONSIDERATIONS		الاعتبارات القياسية
N° cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22mt	قطر الأقفاص
Net Depth	= 10mt	مياني العمق
Net Volume	= 3800m ³	حجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m ³	متوسط الانتاج
Tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في القفص
Tot prod./site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 18

لماواعق المقدرة للاعتبارات أعلاه = 18

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المنتاج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	منطقة إنزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	مواقع مرخصة للاستزراع






Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة ١ كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	موائل المرجانية ٥٠٠ متر
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجرة القابلة ٥٠٠ متر
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر ٥٠٠ متر
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ م
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ م

37°30'0"

37°45'0"



STANDARD CONSIDERATIONS الاعتبارات الأساسية



N° cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22mt	قطر الأقفاص
Net Depth	= 10mt	مياني العمق
Net Volume	= 3800m ³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m ³	متوسط الانتاج
Tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في القفص
Tot prod./site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 13


مواقع المقترنة للاعتبارات أعلاه = 13

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	
Working	
Under the Licensing	
Not working	
Stopped	
Fish Landing Sites	
Coastguard Stations	
5 km distance from coastline	
10 km distance from coastline	
20 km distance from coastline	
Existing Cages	
Potential Aquaculture areas	





مفتاح الخريطة	Legend
الطرق	Roads
ساحل البحر الأحمر	Red Sea Coastline
قُبَّاس الاتصال	Bathymetry
المناطق المحمية	Protected Areas
خط الملاحة	Navigation routes with 1km buffer
الماء 1 كم	Industrial Sites Buffer 1km
موائل مرجانية	Coral Habitat
موائل المرجانية 500m	Coral Habitat 500m Buffer
موائل نباتات	Mangrove Habitat
الشجير	Mangrove Buffer 500m
حدود موقع نباتات	Wadi
الشجير الشاملة 500m	Industrial Sites Buffer 1km
الموانئ الصناعية	Red Sea Coastline 500m Buffer
الماء 500m	KSA Regions and Islands
عمق	Depth
25 إلى 50m	25 to 50m
50 إلى 80m	50 to 80m




STANDARD CONSIDERATIONS: انتدابات عامة



N° Cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 20m	قطر الأقفص
Net Depth	= 10m	عمق الغطس
Net Volume	= 3800m³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسط إنتاج
tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي إنتاج في الأقفص
tot prod./site	= 600 tons	إجمالي إنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 14


لما وافع المقدرة للإعتبارات أعلاه = 14

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المصنج
Working	المعمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	محطة إرزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص ذاتية
Potential Aquaculture areas	موقع مرجحة للإستثمار





Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة الماء 1 كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	موائل المرجانية المسافة 500 م
Mangrove Habitat	موائل النباتات الشجيرات
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجيرات المسافة 500 م
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	الموانئ الصناعية الماء 1 كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر 500 م
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة ال العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	25 إلى 50 م
50 to 80m	50 إلى 80 م



STANDARD CONSIDERATIONS:

N° cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22m	قطر الأقفال
Net Depth	= 10m	عمق الغطاء
Net Volume	= 3865m³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسطة الكثافة
Total Prod./Cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في الأقفال
Total Prod./Site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above
considerations = 20

مواقع المقترنة للاعتبارات أعلاه = 20



Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	
Working	
Under the Licensing	
Not working	
Stopped	
Fish Landing Sites	
Coastguard Stations	
5 km distance from coastline	
10 km distance from coastline	
20 km distance from coastline	
Existing Cages	
Potential Aquaculture areas	

2.5 0 2.5 5 km





© مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة
© JFRC Jeddah Fisheries Research Center





38°30'0"

38°45'0"



STANDARD CONSIDERATIONS:

N° cages	= 20
Cage diameter	= 22m
Net Depth	= 10m
Net Volume	= 3800m³
Prod. Average Con.	= 13kg/m³
tot prod./cage	= 50 tons
tot prod./site	= 800 tons

Estimated Sites of the above considerations = 20


مواقع المقترنة للاعتبارات اعلاه = 20



Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	
Working	
Under the Licensing	
Not working	
Stopped	
Fish Landing Sites	
Coastguard Stations	
5 km distance from coastline	
10 km distance from coastline	
20 km distance from coastline	
Existing Cages	
Potential Aquaculture areas	


2.5 0 2.5 5 km

N

© مركز أبحاث الثروة السمكية JFRC
© Jeddah Fisheries Research Center








STANDARD CONSIDERATIONS:



N° cages	= 25
Cage diameter	= 22m
Net Depth	= 10m
Net Volume	= 5800m³
Prod. Average Con.	= 13kg/m³
tot prod./cage	= 50 tons
tot prod./site	= 800 tons

Estimated Sites of the above considerations = 25

مواقع المقترنة للأعتبارات اعلاه = 25

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المصنع
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	مينطقة إنزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقاضي قائمة
Potential Aquaculture areas	مواقع مرخصة للإستئناف






ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE - RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

أطلس المناطق المرجحة لتربيه الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة - البحر الأحمر - المملكة العربية السعودية

38°45'0"

39°0'0"

39°15'0"



STANDARD CONSIDERATIONS:

N° cages	= 20	= 20
Cage diameter	= 22m	= 22م
Net Depth	= 10m	= 10م
Net Volume	= 3800m³	= 3800م³
Prod. average Con.	= 11kg/m³	= 11كجم³
Total prod./cage	= 50 tons	= 50 طن
Total prod./site	= 500 tons	= 500 طن

Estimated Sites of the above considerations = 14


مواقع المقترنة للاعتبارات اعلاه = 14



Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	
Working	
Under the Licensing	
Not working	
Stopped	
Fish Landing Sites	
Coastguard Stations	
5 km distance from coastline	
10 km distance from coastline	
20 km distance from coastline	
Existing Cages	
Potential Aquaculture areas	

2.5 0 2.5 5 km


N

© مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة
© JFRC Jeddah Fisheries Research Center





Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة المائل ١ كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	موائل المرجانية السائلة ٥٠٠ م
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجر السائلة ٥٠٠ م
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	الموانئ الصناعية المائلة ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر ٥٠٠ م
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة ال العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ م
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ م




STANDARD CONSIDERATIONS: الاعتبارات القياسية



N° cages	= 25	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22m	قطر الأقفال
Net Depth	= 10m	عمق الغطاء
Net Volume	= 5800m³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسطة الإنتاج
tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في الأقفال
Tot prod./site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 13


مواءع المقدرة للاعتبارات أعلاه = 13

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المنتج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	مناطق إنزال
Coastguard Stations	مراكز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	موقع مرجحة للاستزراع





مفتاح الخريطة	Legend
الطرق	Roads
ساحل البحر الأحمر	Red Sea Coastline
ثوابن الأصحاب	Bathymetry
المناطق المحمية	Protected Areas
خط الملاحة	Navigation routes with 1km buffer
الماء 1 كم	
موائل مرجانية	Coral Habitat
موائل المرجانية 500m	Coral Habitat 500m Buffer
موائل نباتات	Mangrove Habitat
الشجيرات	Mangrove Buffer 500m
خط مولود بيات	
وادي	Wadi
الموانئ الصناعية	Industrial Sites Buffer 1km
المناطق 1 كم	
الحدود الفاصلية	Red Sea Coastline 500m Buffer
ساحل البحر الأحمر 500m	
مناطق المملكة	KSA Regions and Islands
البرية السعودية والبحر	
عمق	Depth
25 إلى 50m	25 to 50m
50 إلى 80m	50 to 80m






STANDARD CONSIDERATIONS		الاعتبارات الأساسية
N° cages	= 20	عدد الأقاضع
Cage diameter	= 22mt	قطر الأقاضع
Net Depth	= 10mt	مياني العمق
Net Volume	= 3800m ³	حجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m ³	متوسط الانتاج
Tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في القفص
Tot prod./site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 14

مواقع المقدرة للاعتبارات أعلاه = 14


Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المنتج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	منطقة إنزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقاضع قائمة
Potential Aquaculture areas	مواقع مرجحة للاستزراع





مفتاح الخريطة	Legend
الطرق	Roads
ساحل البحر الأحمر	Red Sea Coastline —
قياس الأعماق	Bathymetry —
المناطق المحمية	Protected Areas
خط الملاحة ١ كم	Navigation routes with 1km buffer
موائل المرجانية	Coral Habitat
الموائل المرجانية ٥٠٠ متر	Coral Habitat 500m Buffer
موائل نباتات	Mangrove Habitat
الشفوي	Mangrove Buffer 500m
حدود موقع نباتات الشفويات الفعلية ٥٠٠ متر	Mangrove Buffer 500m
وادي	Wadi
المواقع الصناعية ١ كم	Industrial Sites Buffer 1km
الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر ٥٠٠ متر	Red Sea Coastline 500m Buffer
مناطق المملكة العربية السعودية والبحر	KSA Regions and Islands
عمق	Depth
٢٥ إلى ٥٠ م	25 to 50m
٥٠ إلى ٨٠ م	50 to 80m

38°45'0" 39°0'0" 39°15'0"




STANDARD CONSIDERATIONS الاعتبارات القياسية


N° cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22mt	قطر الأقفاص
Net Depth	= 10mt	مياني العمق
Net Volume	= 3800m ³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m ³	متوسط الإنتاج
Tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في القفص
Tot prod./site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 2

مواقع المقدرة للاعتبارات أعلاه = 2

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المُنتج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	منطقة إنزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	مواقع مرخصة للاستزراع






ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE - RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

أطلس المناطق المرجحة لتربيه الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة - البحر الأحمر - المملكة العربية السعودية

39°30'0"

39°15'0"

39°0'0"





STANDARD CONSIDERATIONS الاعتبارات الأساسية



N° cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22mt	قطر الأقفاص
Net Depth	= 10mt	مياني العمق
Net Volume	= 3800m ³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m ³	متوسط الإنتاج
Tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في القفص
Tot prod./site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 19


لمواقع المقترنة للاعتبارات أعلاه = 19



Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المنتج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	منطقة إنزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	مواقع مرجحة للاستزراع







Legend	مفتاح الخريطة
.....	طرق
—	ساحل البحر الأحمر
—	طريق الاتصال
[Protected Areas]	المناطق المحمية
[Navigation routes with 1km buffer]	خط الملاحة المائل ١ كم
Orange	موائل مرجانية
Orange (500m Buffer)	موائل المرجانية النائل ٥٠٠ م
Green	موائل نباتات
Green (500m Buffer)	حدود موائع نباتات الشجيرات النافذة ٥٠٠ م
Grey	وادي
Brown	الموانئ الصناعية
Brown (1km Buffer)	المناطق الصناعية المائل ١ كم
Red	الحدود الفاصلية
Red (500m Buffer)	ساحل البحر الأحمر ٥٠٠ م
Yellow	مناطق المملكة
Yellow	البرية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ م
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ م







STANDARD CONSIDERATIONS:

N° cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22m	قطر الأقفص
Net Depth	= 10m	عمق الغطاء
Net Volume	= 5800m³	حجم الغطاء
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسطة الكثافة
Total prod./cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في الأقفص
Total prod./site	= 600 tons	إجمالي الإنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 30

مواقع المقترنة للأعتبرات اعلاه = 30



Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	
Working	
Under the Licensing	
Not working	
Stopped	
Fish Landing Sites	
Coastguard Stations	
5 km distance from coastline	
10 km distance from coastline	
20 km distance from coastline	
Existing Cages	
Potential Aquaculture areas	

2.5 0 2.5 5 km





© مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة
© JFRC Jeddah Fisheries Research Center





Legend	مفتاح الخريطة
Roads	طرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة ١ كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	المواطن المرجانية ٥٠٠ متر
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجرة القابلة ٥٠٠ متر
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر ٥٠٠ متر
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ متر
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ متر



STANDARD CONSIDERATIONS: عوامل تقييدية

N° cages	= 29	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22m	قطر الأقفال
Net Depth	= 10m	عمق الغسل
Net Volume	= 5800m³	حجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسط إنتاج
tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي إنتاج في الأقفال
tot prod./site	= 390 tons	إجمالي إنتاج في الموقع


Estimated Sites of the above considerations = 29



لمواقع المقيدة للإعصارات اعلاه = 29

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المتع
Working	المعلم
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	محطته إبرال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	موقع مرجحة للإستزراع




© مركز أبحاث الثروة السمكية
© JFRC Jeddah Fisheries Research Center





Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	طبقات الأعماق
Protected Areas	المحميات المائية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة الماء ١ كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	الموائل المرجانية الماء ٥٠٠ متر
Hangrove Habitat	موائل نباتات الشجر
Hangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجر المائية ٥٠٠ متر
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية الماء ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الساحل المائي البحر الأحمر ٥٠٠ متر
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ متر
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ متر

© جواد احمد القرشى
© JFRC Jeddah Fisheries Research Center




STANDARD CONSIDERATIONS: الاعتبارات القياسية:



N° cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22m	قطر الأقفاصل
Net Depth	= 10m	عمق الغطاء
Net Volume	= 5800m³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسطة الإنتاج
Total Prod./Cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في الأقفال
Total Prod./Site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في الموقع


Estimated Sites of the above considerations = 21

مواقع المقترنة للاعتبارات أعلاه = 21

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المُنتج
Working	المُعمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	محلية إفراج
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص ذاتية
Potential Aquaculture areas	مواقع مرخصة للاستزراع








STANDARD CONSIDERATIONS:



N° Cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22m	قطر الأقفال
Net Depth	= 10m	عمق الغسل
Net Volume	= 5800m³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسطة الانتاج
tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في الأقفال
tot prod./site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في الموقع


Estimated Sites of the above considerations = 27

مواقع المقترنة للاعتبارات أعلاه = 27

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	
Working	
Under the Licensing	
Not working	
Stopped	
Fish Landing Sites	
Coastguard Stations	
5 km distance from coastline	
10 km distance from coastline	
20 km distance from coastline	
Existing Cages	
Potential Aquaculture areas	








STANDARD CONSIDERATIONS:



N° Cages	= 20	= 20
Cage diameter	= 22m	= 22م
Net Depth	= 10m	= 10م
Net Volume	= 3800m³	= 3800م³
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	= 13كجم³
Targeted cage	= 50 tones	= 50 طن
Total prod./site	= 800 tones	= 800 طن


Estimated Sites of the above
considerations = 16

مواقع المقترنة للاعتبارات أعلاه = 16

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	
Working	
Under the Licensing	
Not working	
Stopped	
Fish Landing Sites	
Coastguard Stations	
5 km distance from coastline	
10 km distance from coastline	
20 km distance from coastline	
Existing Cages	
Potential Aquaculture areas	







STANDARD CONSIDERATIONS: الاعتبارات القياسية:

N° cages	= 25	= 25
Cage diameter	= 22m	= 22م
Net Depth	= 10m	= 10م
Net Volume	= 5800m³	= 5800م³
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	= 13كجم/م³
Total Prod./Cage	= 50 tons	= 50 طن
Total Prod./Site	= 600 tons	= 600 طن

Estimated Sites of the above considerations = 27


مواقع المقترنة للاعتبارات أعلاه = 27



Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المنتج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	مينطقة إنزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	مواقع مرخصة للاستزراع




© مركز أبحاث الثروة السمكية JFRC

© JFRC Jeddah Fisheries Research Center





Legend	مفتاح الخريطة
Roads	طرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة ١ كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	موائل المرجانية ٥٠٠ متر
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجرة القابلة ٥٠٠ متر
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر ٥٠٠ متر
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ متر
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ متر




STANDARD CONSIDERATIONS:


	الاعتبارات القياسية
N° cages	= 20
Cage diameter	= 22m
Net Depth	= 10m
Net Volume	= 5800m³
Prod. Average Con.	= 15kg/m³
Total Prod./Cage	= 50 tons
Total Prod./Site	= 800 tons

Estimated Sites of the above considerations = 56

مواقع المقترنة للاعتبارات اعلاه = 56

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المصنج
Working	المعمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوطدة
Fish Landing Sites	محطة إلزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	موقع مرخصة للإستئناف







Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق محمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة الفاصل 1 كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	الموائل المرجانية الفاصلة 500 م
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشورى
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشورى الفاصلة 500 م
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية الفاصل 1 كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصل لساحل البحر الأحمر 500 م
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة العربية السعودية والجزر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ الى ٥٠
50 to 80m	٥٠ الى ٨٠

ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE - RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

أطلس المناطق المرجحة لتربيه الأحياء المائية بنظام الأقاضي العائمة - البحر الأحمر - المملكة العربية السعودية

42°0'0"

42°15'0"



STANDARD CONSIDERATIONS

N° cages	= 25	= 25
Cage diameter	= 20m	= 20م
Net Depth	= 10m	= 10م
Net Volume	= 3800m³	= 3800م³
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	= 13كجم³
Total Prod./Cage	= 50 tons	= 50 طن
Total Prod./Site	= 380 tons	= 380 طن

Estimated Sites of the above considerations = 52


لمواقع المقترنة للاعتبارات اعلاه = 52


Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المُنتج
Working	المُعمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يُعمل
Stopped	مُوقوفة
Fish Landing Sites	مُسطّلية إرال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقاضي ذاتية
Potential Aquaculture areas	موقع مرجحة للاستزراع

2.5 0 2.5 5 km

N

© مركز أبحاث الثروة السمكية
© JFRC Jeddah Fisheries Research Center






Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة المائل ١ كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	موائل المرجانية المائلة ٥٠٠ م
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجر المائلة ٥٠٠ م
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية المائلة ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر ٥٠٠ م
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ م
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ م

ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE - RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

أطلس المناطق المرجحة لتربيه الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة - البحر الأحمر - المملكة العربية السعودية




STANDARD CONSIDERATIONS الاعتبارات الأساسية



N° cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22mt	قطر الأقفاص
Net Depth	= 10mt	مياني العمق
Net Volume	= 3800m³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسط الإنتاج
Tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في القفص
Tot prod./site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 32

مواقع المقدرة للاعتبارات أعلاه = 32

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	الم المنتج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	منطقة إنزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	مواقع مرجحة للاستزراع






Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحظية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة المائل ١ كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	موائل المرجانية السائلة ٥٠٠ م
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجر السائلة ٥٠٠ م
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية المائلة ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر ٥٠٠ م
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة ال العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ م
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ م

ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE - RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

أطلس المناطق المرجحة لتربيه الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة - البحر الأحمر - المملكة العربية السعودية



STANDARD CONSIDERATIONS


	الاعتبارات القياسية
N° cages	= 20
Cage diameter	= 22m
Net Depth	= 10m
Net Volume	= 3800m³
Prod. Average Con.	= 13kg/m³
Total Prod./Cage	= 50 tons
Total Prod./Site	= 800 tons

Estimated Sites of the above considerations = 40

مواقع المقترنة للاعتبارات أعلاه = 40

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المتنج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	مطافئ ابراج
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمة
Potential Aquaculture areas	موقع مرخصة للإستثمار






Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة المائل 1 كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	موائل المرجانية المسافة 500 م
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجر المسافة 500 م
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية المائل 1 كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر 500 م
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة ال العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	25 إلى 50 م
50 to 80m	50 إلى 80 م

ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE - RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

أطلس المناطق المرجحة لتربيه الأحياء المائية بنظام الأقاضي العائمة - البحر الأحمر - المملكة العربية السعودية




STANDARD CONSIDERATIONS



N° cages	= 25	عدد الأقباض
Cage diameter	= 22mt.	قطر الأقباض
Net Depth	= 10mt.	عمق الغطس
Net Volume	= 5800m³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسطة الكثافة
tot prod./cage	= 50tons	إنتاج كل قبضة
Tot prod./site	= 800 tons	إنتاج الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 26

لمواقع المقترنة للاعتبارات أعلاه = 26

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المنتج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	مطافئ ابرال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقاضي ذاتية
Potential Aquaculture areas	مواقع مرخصة للاستزراع







Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	فيراس الأعمان
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة ١ كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	موائل المرجانية ٥٠٠ م
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجرة القابلة ٥٠٠ م
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر ٥٠٠ م
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ م
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ م

ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE - RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

أطلس المناطق المرجحة لتربيه الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة - البحر الأحمر - المملكة العربية السعودية

41°30'0"

41°45'0"




STANDARD CONSIDERATIONS الاعتبارات الأساسية



N° cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22mt	قطر الأقفاص
Net Depth	= 10mt	مياني العمق
Net Volume	= 3800m ³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m ³	متوسط الإنتاج
Tot prod./cage	= 50 tons	إجمالي الإنتاج في القفص
Tot prod./site	= 800 tons	إجمالي الإنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 14

لمواقع المقدرة للاعتبارات أعلاه = 14


Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	المنتج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقفة
Fish Landing Sites	منطقه إنزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص قائمه
Potential Aquaculture areas	مواقع مرجحة للاستزراع





ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE - RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA

اطلس المناطق المرجحة لتربيه الاحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة - البحر الأحمر - المملكة العربية السعودية




STANDARD CONSIDERATIONS: انتدابات عادي


N° Cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22m	قطر الأقفص
Net Depth	= 10m	عمق الغطس
Net Volume	= 3800m³	حجم القفص
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسطة الكثافة
Total Prod./Cage	= 50 tons	إجمالي إنتاج كل أقفص
Total Prod./Site	= 600 tons	إجمالي إنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 8


مواقع المقندة للاعتبارات أعلاه = 8

Aquaculture	تربيه الاحياء المائية
Producer	المنتج
Working	العمل
Under the Licensing	تحت الترخيص
Not working	لا يعمل
Stopped	متوقف
Fish Landing Sites	منطقه إنزال
Coastguard Stations	مركز حرس الحدود
5 km distance from coastline	المسافة من الساحل 5 كم
10 km distance from coastline	المسافة من الساحل 10 كم
20 km distance from coastline	المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages	أقفاص ذاتية
Potential Aquaculture areas	مواقع مرخصة للاستزراع





Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق المحمية
Navigation routes with 1km buffer	خط الملاحة ١ كم
Coral Habitat	موائل المرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	موائل المرجانية ٥٠٠ متر
Mangrove Habitat	موائل نباتات الشجر
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشجرة القابلة ٥٠٠ متر
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصلية لساحل البحر الأحمر ٥٠٠ متر
KSA Regions and Islands	مناطق المملكة العربية السعودية والبحر
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ متر
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ متر



STANDARD CONSIDERATIONS: الاعتبارات القياسية:

N° cages	= 20	عدد الأقفاص
Cage diameter	= 22m	قطر الأقفال
Net Depth	= 10m	عمق الغطاء
Net Volume	= 3800m³	الحجم الصافي
Prod. Average Con.	= 13kg/m³	متوسطة الكثافة
tot prod./cage	= 50 tons	إنتاج الأقفال في كل قفص
Tot prod./site	= 800 tons	إجمالي إنتاج في الموقع

Estimated Sites of the above considerations = 16
المواقع المقترنة للاعتبارات أعلاه = 16


لمواقع المقترنة للاعتبارات أعلاه = 16

Aquaculture	تربيه الأحياء المائية
Producer	
Working	
Under the Licensing	
Not working	
Stopped	
Fish Landing Sites	
Coastguard Stations	
5 km distance from coastline	
10 km distance from coastline	
20 km distance from coastline	
Existing Cages	
Potential Aquaculture areas	

2.5 0 2.5 5 km



© مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة
© JFRC Jeddah Fisheries Research Center



INDEX MAP

The Atlas consists of 36 map sheets.

The maps are ordered following the Arabic page setting and they are displayed in reverse order (from 36 to 1) for the English reader.




Figure 16. Map Index

Methodology used for the identification of potential marine aquaculture sites

A methodology was selected so as to provide a consistent and robust approach to using GIS for data capture, interpretation, storage and analysis. This included the capturing of new coastal and terrestrial data along the Red Sea coastline in the timescale of the project and at an appropriate scale to carry out the site selection study. All spatial datasets are stored in the GIS at JFRC and are used where appropriate as part of the site selection and for the identification of potential areas for development. Many of the important datasets were captured from an interpretation of detailed satellite imagery.

As a result of the GIS analysis this Atlas was produced highlighting suitable areas for cage farming based on the criteria set out by the cage aquaculture, the environmental experts and the UTF/SAU/048/SAU Project Manager. It was concluded that a standard consideration be used to demonstrate the potential of a typical farm of 20 cages in an 800 m x 480 m configuration with a typical depth of 35 m located within a 1000 m x 1000 m block (Figure 14). Each 1 km x 1 km site would be located 3 km away from any neighbouring site (Figure 15). These parameters have been considered to perform a broad evaluation of the number of standard cage farm sites that can be placed in the suitable areas. If this standard cage configuration and location scenario for the Red Sea were adopted then there would be a potential for over 600 cage sites. If only 3/1 of the suitable sites identified were used in the scenario above then 200 x 800 tonnes of fish production = 160,000 tonnes of finfish per annum would be achievable (using standard design considerations as shown below and very conservative production estimates).

STANDARD CONSIDERATIONS

N° cages	
Cage diameter	= 22 m
Net Depth	= 10 m
Net Volume	= 3800 m ³
Prod. Average	= 13 kg/m ³
Total Prod. / cage	= 50 tons
Total prod. / site	= 800 tons




Figure 15. Typical distance from neighbouring site




Figure 14. Typical cage site configuration suitable for Red Sea finfish mariculture

journey times cause operational and logistical difficulties that should be carefully assessed and evaluated if the licensed area is located at more than 10 km from shore.

- Offshore (out of sight). Cages can cause visual conflicts (affecting seascape) if they are placed in front of an urban area, tourist facilities or weekend and holiday homes. However if they are placed out of sight of the shore then the conflict is minimised.

Maps are provided with dotted lines indicating the distance of 5km, 10km and 20km from the coastline



Figure 13. Boats servicing fish farms often travel large distances with feed and maintenance materials



Figure 10. Corals are environmentally sensitive areas and require protection

The dataset on coral habitat was also interpreted from high resolution satellite imagery and locations buffered to allow for an extended protection zone of 500m.

Industrial/desalination plants: Desalination plants discharge seawater at higher salinity and temperature than ambient sea water. Because this may cause problems for fish production it is recommended that there is a buffer of 1 km around such plants.



Figure 11. Desalination plant near Jeddah

A dataset of industrial locations was provided by Saudi Aramco to include refineries, desalination plants and any other known industrial sites.

Aquaculture		تربيه الأحياء المائية
Producer		المنتاج
Working		العمل
Under the Licensing		تحت الترخيص
Not working		لا يعمل
Stopped		متوترة
Fish Landing Sites		منطقة إنزال
Coastguard Stations		مركز حرس الحدود
Red Sea Coastline 5km		المسافة من الساحل 5 كم
Red Sea Coastline 10km		المسافة من الساحل 10 كم
Red Sea Coastline 20km		المسافة من الساحل 20 كم
Existing Cages		أقفاص قائمة
Potential Sites		موقع مرجحة

Figure 12. Legend from Atlas showing other layers used as part of site selection

General potential conflicts with other aquaculture farms

Background bacterial levels can increase around fish cages and water quality can also be affected locally which could cause problems for farms that are sharing this water supply. In addition there is a risk of disease transfer from one farm to another if farms are not sufficiently separated.

Other offshore cage farms: There must be a buffer of 3 km between individual cage licensed areas.

Existing Shrimp/fish farm and hatchery water intlets: There should be a buffer between fish cage licence areas and water intakes for shrimp farms or fish or shrimp hatcheries. (Suggested 3 km).

Information on the locations of other aquaculture farms is available on the maps to facilitate the users in the site selection process.

Geographic coordinates of aquaculture sites have been made available by the MoA and verified through satellite images interpretation or direct ground truthing.

Fish landing sites: Existing fish landing sites provide ideal locations for potential aquaculture as these sites already have established jetties and they can often be expanded more economically than through having to create new facilities.

Geographic coordinates of fish landing sites have been made available by the MoA and verified through satellite images interpretation.

Coast guard stations: Coast guard stations located near to jetties that service the aquaculture industry are ideal for safety reasons. If coast guard stations are not close by it is recommended that a small coast guard station is constructed close to the jetty.

Geographic coordinates of Coast Guard stations have been made available by the MoA and verified through satellite images interpretation.

Distance from shore: There are number of legal reasons and operational considerations with respect to the maximum distance that cages could be located offshore.

- Operational extent. Offshore cages need to be serviced on a daily basis to bring food to the fish, and to undertake feeding and husbandry activities, to change nets and to take harvested fish back to shore. If the cages are located too far offshore, unless there is a permanent offshore platform located at sea, boat

Wadis (Rivers): Although wadis do not flow all the year, occasionally there can be high levels of freshwater passing through. This can

- Cause changes in water temperature and water turbidity
- Cause changes in salinity with stratification of the water column
- Bring drifting objects down the wadi into the water body and then into the nets (trees, timbers, large man-made floating objects)

Therefore, to prevent any restriction of wadi flow, licensed fish cages should have locations at least 500 m from wadi outlets, or 500 m away from wadi edges.



Figure 7. Water flow from wadis can be particularly disruptive during times of heavy rain or flooding

The wadi dataset was built through manual digitization and interpretation of 50cm geo-referenced satellite imagery

Navigation routes: Large vessels (oil tankers, cruise ships, cargo ships, etc.) passing through designated navigation routes can disturb fish production in terms of the waves created by the vessels, underwater engine and propeller noise, etc. Therefore, for safety and production reasons, fish cage licences should be located an appropriate distance from navigation routes (1km)



Figure 8. Navigation routes can now be found online at websites such as www.marinetraffic.com

The navigation route dataset was developed using maps of historical traffic density in the Red Sea, available online (www.marinetraffic.com) The ship traffic density maps were digitized into the GIS and buffered by 1km

Protected Areas: There are three legally designated marine protected areas along the Red Sea Coast. Additionally, there are a number of other environmentally sensitive areas that have been identified by PME as "proposed areas". There needs to be caution about developing aquaculture in these environmentally sensitive areas. Although all the protected areas have been considered in this Atlas, and potential sites within them excluded, it would be possible to reconsider sites if the "proposed areas" are not sanctioned. To reduce any kind of threats for protected areas, a minimum distance of 1 km from these sites should be respected.

The dataset of marine protected areas has been established by PME most likely from GPS positions and distributed in GIS format.

Sensitive habitats and species: Sites of particular value for nature conservation should be protected especially for Marine Protected Areas, conservation areas, areas that have important bird populations, wetlands of importance as waterfowl habitats and nesting beaches for turtles.

Mangroves: Mangroves provide natural protection to the coastlines as well as providing breeding, nursery and feeding grounds for wild fish. Shrimp pond construction should not destroy mangrove areas and so ponds should be located at least 500 m away from natural mangrove areas.



Figure 9. Mangroves are environmentally sensitive areas and require protection

Mangroves are easily visible from high resolution satellite imagery (50cm QuickBird) and classified as polygons in a dataset. A further buffer of 500m was applied to the mangrove classification.

Corals: If production cages are located too close to corals, the suspended solids that are produced can settle and smother the coral. It is therefore recommended that the distance between the edge of the farm area and the coral reef crest must be more than 500 m. Coral areas, together with the buffer, have been excluded from being allocated as potential mariculture locations.

THE MAJOR CRITERIA USED IN THE ATLAS FOR SELECTION OF AREAS SUITABLE FOR CAGE AQUACULTURE

The major criteria used to identify the most promising areas for cage aquaculture development were mostly determined by the importance/relevance and the availability of the data within KSA. The project was fortunate that, by using recent satellite imagery and obtaining other reliable existing data, GIS-based functions could readily be used to determine suitable potential sites for aquaculture. It should be noted that, having established this mariculture atlas, the next step for site selection would be to carry out a **detailed site survey** in the general areas indicated in the Atlas.

Legend	مفتاح الخريطة
Roads	الطرق
Red Sea Coastline	ساحل البحر الأحمر
Bathymetry	قياس الأعماق
Protected Areas	المناطق محمية
Navigation Buffer 1km	خط الملاحة الفاصل ١ كم
Coral Habitat	سوائل مرجانية
Coral Habitat 500m Buffer	السوائل المرجانية الفاصلة ٥٠٠ م
Mangrove Habitat	مواطن نباتات الشورى
Mangrove Buffer 500m	حدود موقع نباتات الشورى الفاصلة ٥٠٠ م
Wadi	وادي
Industrial Sites Buffer 1km	المواقع الصناعية الفاصلة ١ كم
Red Sea Coastline 500m Buffer	الحدود الفاصل الساحل الجرلاضي ٥٠٠ م
Red Sea Islands	جزر البحر الأحمر
KSA Regions	مناطق المملكة العربية السعودية
Depth	عمق
25 to 50m	٢٥ إلى ٥٠ م
50 to 80m	٥٠ إلى ٨٠ م

Figure 5. Legend from the Atlas showing features used as part of the site selection process

Bathymetry (Water depth). For the following reasons water depth is probably the most important criteria used for the siting of offshore cages:

- Allows dispersion of particulate matter
- Allows water exchange
- Allows deeper nets for more stable water quality and temperature and reduced water movement during storms

Generally, in sites having water deeper than 25 metres, cages should be placed in the deepest possible area. This is in order to offer maximum security and the lowest environmental impact. Moorings placed in waters deeper than 80m are difficult to inspect and to maintain by divers.

In the Red Sea the suitable water depth range for cages has currently been assumed as 25m to 50m and from 50m to 80m depending upon the type of cages being considered.



Figure 6. Bathymetry contours showing depth in metres

Bathymetry dataset has been developed using different sources of information:

- Digitalizing of the available Admiralty Marine Charts (Operational Navigational Charts ONC)
- Satellite images have been analysed and depth ranges between 0 and 5 m have been interpreted where visible coral, sand is observed

GENERAL POTENTIAL CONFLICTS with other users

Waste dumping points and coastal underwater pipe outlets: These points must be avoided and mariculture sites must be located at a distance of at least 1 km.

Areas with underwater cables or conduits: These areas must be avoided and no moorings or cages may be deployed here (a suggested distance of 200 m is recommended).

Areas of interest for tourism: Although tourism is not much developed on the Red Sea coastline, and tourist areas are mainly represented by residential districts near large urban locations and are used for seasonal holidays, interactions with aquaculture can generate conflicts and objections against both land and water-based farm facilities. Farm siting must take into consideration tourist needs and they should be located at a distance of at least 3 km from tourist hotels and beaches.

Areas of archaeological interest: These areas must be avoided, as ruins or other finds can be damaged by underwater moorings or by land-based construction.

Urban areas: In coastal urban housing areas there can be conflict between the residents and aquaculture, particularly due to visual aspects (the seascape). Therefore it is recommended that there is a buffer of 3 km between urban and fish cage areas. However, there is rapid coastal urban development in the Kingdom, particularly in the expanding coastal towns, and some form of planned zonation is recommended.

Industrial, agricultural farm and domestic effluent outlets: Sources of water pollution can cause problems for fish survival and growth. Because sources of fish farm effluents can be a biosecurity risk for fish in the cages, the cage licence areas should be located an appropriate distance from effluent outlets (a suggested buffer of 500 m).

Vessel anchorage areas: These areas are often located in the vicinity of harbours, straits or industrial areas. They are used as standby anchorage for managing the marine traffic flow and for vessels waiting to anchor. They are usually indicated on marine charts and cannot be occupied by aquaculture cages. Therefore it is recommended that there is a buffer of 500 m from anchorage areas.

Areas of military importance: There could be zones of military importance such as navigation routes or firing ranges in marine areas where cage aquaculture activity may not be developed. It is recommended that there is a buffer of 5 km.

Province boundaries: Aquaculture licences are awarded by provinces or municipalities that have jurisdiction over their own water bodies. Therefore farms that are located across provincial or municipality boundaries may cause conflict so they should be located wholly within one administrative area.

National Border areas: National border areas are usually sensitive security locations, therefore aquaculture should be located away from these areas.

Ports and dockyards: There could be conflicts between port or dockyards and offshore cages due to the navigation routes for boats entering or exiting the area. It is therefore recommended that there should be a buffer zone of at least 500 m.

Recreational boating and diving: Areas that are important for recreational boating (such as yachting or fishing) or important dive sites (wrecks or corals) should be avoided. These areas might need to be officially designated.

Traditional fishing areas: Conflicts with the fishery sector can arise mainly in competition for access to traditional fishing areas. Areas traditionally exploited by local fishing communities should not be used for cage aquaculture.

However, limiting the access in these areas to fishermen will generate conflict between the fishery sector and farmers. Where conflict may occur it would be advisable for the two sectors to come to a zonation agreement.

Fish nursery or spawning grounds: Mangroves, coral reef, and underwater sea-grass meadows are areas proven to be relevant for fish stock reproduction and/or are used as nursery and spawning grounds by local species. Cages should not be located near these areas as they may negatively interfere with wild fish behaviour or, in the case of significant escapes of predator species, they may become a threat to juvenile populations. It is recommended that the cage farms should be located avoiding overlapping with known fish nursery or spawning grounds.

Port areas or sea infrastructures: Mooring inside a port or near the outer harbour entrance should be avoided. This is to permit safe manoeuvring of ships and boats approaching or exiting the port. Port authorities will indicate the buffer zone to be respected according to the ship/boat traffic type using the harbour.

Turtle beaches: Marine fish farming sites may cause disturbance to turtle nesting from light, noise and boat usage. In addition, the construction, use and maintenance of shore bases built to support finfish farms may disturb turtles and cause deterioration of their habitat through destruction and physical damage to nesting beaches. (a suggested buffer of 1 km).

Water salinity. Due to the low tolerance of some species to high salinity levels, water salinity is important for the selection of some temperate species that might be cultured in the north of the Red Sea (Figure 4)




Figure 4. Salinity of the Red Sea

Current speed. Good water exchange through the cage nets is essential for the replenishment of oxygen and the removal of waste metabolites and strong currents can deform the cage shape reducing net volume. Current velocities in coastal marine areas typically range from 0 to 0.25 m.s^{-1} at some sites during strong winds or tides. Offshore, currents vary seasonally and tend to be dependent on the prevailing wind strength.

Wave climate. Of all the possible problems in offshore cage culture, wave action is of most concern. Wave climate is important as it influences the choice of both the design and strength of materials (for cages, nets and moorings) as well as influencing the operational aspects of the farm.

Four factors influence the formation of waves:

- Wind speed
- Distance of open water that the wind has blown over (called the fetch)
- Width of area affected by fetch
- Time duration that the wind has blown over a given area

All of these factors work together to determine the size of wind waves. The greater each of the variables, the larger the waves will be.

Site exposure: Shelter from the strongest prevailing wind and/or wave direction is important. Much of the Red Sea coast is exposed to waves, but there are many areas where cages could be located that would be protected by outer reefs.

Infrastructure: Aquaculture requires basic infrastructure for the construction of facilities, operation, servicing and marketing of the product.

- **Roads:** There must be all weather roads close by so that operational supplies, personnel and the fish produced can be delivered to and taken from the site.
- **Electricity:** There should be electrical supply close to the site for water pumps, office air-conditioning, ice making etc. (at nurseries and fish landing sites in particular)
- **Jetties:** For cage culture sites there should be a jetty with sufficient water depth for boats laden with feed and fish to load safely, especially during strong wind conditions.
- **Coastal topography:** Access is required for jetties.

Territorial waters (or a territorial sea): These are defined by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, as a coastal marine belt extending at most 12 nautical miles (22 km; 14 miles) from the coastline (usually the mean low-water mark) of a coastal state. The territorial sea is regarded as the sovereign territory of the state and this applies to the airspace over and seabed below.

As the Red Sea is a relatively deep water body, the areas with suitable water depth for cages are mostly inshore within territorial waters.

Exclusive Economic Zone (EEZ). Under the 1982 United Nations Convention on the law of the sea, an Exclusive Economic Zone (EEZ) is defined as a sea zone over which a state has special rights over the exploration and use of marine resources. It stretches from the seaward edge of the state's territorial sea out to 200 nautical miles (370.4 km). If a water body between two countries is less than 400 nautical miles wide, the EEZ boundary is the mid line between the two country coastlines. So, for the Red Sea the EEZ for the KSA boundary stretches down the middle of this sea.

Climate change: Consideration of future predicted climate change is becoming increasingly important for the selection of suitable mariculture sites.

- **Sea Level Rise:** the Intergovernmental Panel on Climate Change's (IPCC) Fourth Assessment Report (AR4) predicted that by 2100, global warming will lead to a sea level rise of 180 to 590 mm. However more recent research finds that sea-level rise by 2100 is likely to be at least twice as large as that presented by IPCC AR4. Significant sea level rise will make low level coastal areas more prone to flooding and onshore shrimp farms should be located in areas at least 2 meters above present sea level. .
- **Increasing temperatures:** Climate change models are predicting an increase in mean seawater temperatures of between 1.0 and 1.4°C by 2050.




Figure 2. Sea surface temperature and chlorophyll a concentrations

(a) sea surface temperature and **(b)** water chlorophyll a concentrations (as a proxy for nutrient supply) were derived from NASA, Giovanni online data system, developed and maintained by the NASA GES DISC, Ocean Color Radiometry, monthly averaged MODIS-Aqua 4 km. Images represent averaged data from July to September (temperature) or to October 2011 (chlorophyll a, late summer) and from January to March 2012 (late winter).

Chlorophyll Concentrations. Chlorophyll-a concentrations can be measured from satellite imagery and are an important indicator in evaluating nutrition status, water quality and organic pollution extent, providing useful information for managing water quality and monitoring water pollution. For the Red Sea the levels of chlorophyll-a concentrations vary between winter and summer months, though they are generally higher in the south (Figure 2b).

Wind conditions. The weather conditions across the Red Sea alter significantly between the winter and summer months. From late November through March, strong cold fronts track across the northern Red Sea approximately every 3 days. Behind these cold fronts, cold air funnels or "channels" through the narrow waters of the Gulf of Suez, and farther south into the Red Sea to approximately 18N. As a result, enhanced north-northwest winds (approximately Beaufort Force 5-7) surge across the Gulf of Suez and the northern Red Sea of and sea swells may build up to 8-12ft. Behind exceptionally strong cold fronts, winds will increase to Beaufort Force 8 or 9, particularly near the Gulf of Suez with swells building to 10-15ft. During April and May, and again in September through to early November, the cold fronts are weaker and less frequent, tracking across the northern Red Sea about every 4-5 days and tending not to push as far south. In terms of site selection the areas of stronger winds are considered less suitable due to exposure (Figure 3)




Figure 3. Winter and Summer prevailing wind conditions

(Source: GFS / NCEP / US National Weather Service. Website <http://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-323.04,20.67,1771>)

potential of the sector. This enables MoA to properly quantify and prioritize the support to be channelled to relevant governmental institutions. Once established, the GIS facility has provided spatial information to help new investors to identify suitable sites for development.

An important component of the project was to set up a GIS facility and capability at the Jeddah Fisheries Research Center (JFRC) and to train staff in GIS and spatial information. Methodologies using GIS have been selected to provide a consistent and robust approach for data capture, interpretation, storage and analysis. This included the capturing of new coastal and terrestrial data within KSA particularly that relating to the Red Sea and to aquaculture. All spatial datasets are stored in the GIS and used where appropriate as part of the analysis for site selection, inventories, carrying capacity and the identification of potential areas for development. Many of the important datasets have been captured from the interpretation of high resolution satellite imagery and loaded into the JFRC GIS facility.

As part of the study this Atlas has been produced, identifying the location of potential sites for cage aquaculture and showing potential areas for both physical and environmental conflicts. This provides guidance to MoA to: (i) assist current and future investors, (ii) show where to issue licences, (iii) show where to carry out further more detailed investigations such as site surveys, carrying capacity analysis or, environmental impact assessments (EIA), and (iv) show any other studies required before establishing the cage farms. This Atlas is also expected to be of practical use to the scientific and educational communities, policy and decision-makers, and to commercial enterprises.

THE RED SEA COASTLINE

The Red Sea coastline of KSA is situated between 16° 20' and 29° 20' N and 34° 28' and 42° 48' E. It is approximately 1,800km in length and over 50,000 km² of the KSA marine area was analysed. (Figure 1)



Figure . 1 Red Sea Location

SITE SELECTION CRITERIA IMPORTANT FOR MARICULTURE

The site identification and selection aspects for coastal and marine aquaculture (mariculture) mapping used satellite imagery combined with other available mapped information (such as coastal habitats, wadis, navigation routes, infrastructure including planning zones, as well as coastal features such as bathymetry / water depths and topography) using GIS to perform a spatial analysis of the acquired dataset/layers to determine potential aquaculture areas.

The selection of suitable sites is generally influenced by

- Environmental (chemi-physical) parameters affecting the suitability of the site for fish production
- Potential environmental impacts
- Infrastructure for servicing considerations, and
- The need to safeguard the interests of other users of coastal waters

There are certain more specific factors that also need to be taken into account in determining the acceptability of mariculture development proposals. These include:

- Distance to other fish farms;

- Proximity to nature conservation interests, including corals and turtle nesting beaches;
- Methods of operation (e.g. lighting impacts, associated noise, etc.);
- Planning context (local plans, or coastal zone designations) including existing aquaculture zones or plans;
- Potential impacts on landscape and visual seascape;
- Availability of any land access and necessary infrastructure;
- Impact and proximity to areas of coastal security, plus various other activities or restrictions;
- Effects on recreation and tourism; and
- Impact on navigation and other fishery interests.

GENERAL CRITERIA FOR MARINE FISH PRODUCTION

The more general criteria that should be considered on a broad scale for the **selection of potential sites** suitable for cage aquaculture include:

Sea Surface Temperature. The temperature range of the water must be acceptable for the species being cultured. Therefore seawater temperature data must be collected and be considered for the selection of species. Temperature has a direct influence on fish metabolism and consequently on the oxygen consumption, fish activity, ammonia and carbon dioxide production. Fortunately for the Red Sea the temperature range is acceptable for many of the potential and proposed species and therefore it is not a constraint when considering site selection along the whole coastline. (Figure 2a)

ACKNOWLEDGEMENTS

This document has been funded and produced in the framework of the Technical Cooperation Programme between the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) during the implementation of the unilateral trust fund project "Strengthening and supporting further development of aquaculture in the Kingdom of Saudi Arabia (UTF/SAU/048/SAU)".

The overall work has been developed under the technical guidance of Justin Saunders, Geographic Information System (GIS) expert, the coordination of Francesco Cardia, FAO Project Manager and the technical assistance of Muhammad Basil Rafiq, IT specialist.

The technical inputs of Alessandro Ciattaglia, cage aquaculture expert, and Richard Antony Corner, environmental expert are acknowledged for the application of site selection criteria.

The Jeddah Fisheries Research Center researchers have contributed significantly in the development of the GIS database and the ground truthing, the verification of the datasets used in this analysis and the finalization of the document in both the languages.

The Government of the Kingdom of Saudi Arabia and the Ministry of Agriculture are duly acknowledged for having financed this publication.

INTRODUCTION

Aquaculture and more specifically marine aquaculture is a growing industry that currently supplies approximately 50 per cent of the world's global fish market. This growth trend will certainly continue with an anticipated global increase in production of 30 million tonnes required by 2050 in order to provide fish products to a growing global population. FAO indicates that mariculture, the cultivation of fish in the sea for food will, in the future, be the major sub-sector of the fish production sector to expand. Despite competing needs the marine environment offers an available resource and space for expansion,

The Kingdom of Saudi Arabia has two coastlines, in the West the Red Sea and in the East the Arabian Sea. KSA is expected to expand mariculture primarily in the Red Sea and it is on this assumption that these guidelines, plus the criteria for optimum production, have been developed. Much of the detail, however, is generally applicable and may apply to both of the KSA coastlines.

Expansion and the long-term sustainability of mariculture in the Red Sea will depend on the development and adoption of best management practices, which essentially includes the identification and selection of the right sites to locate fish farms. Locating these sites is the objective of this Atlas. Any aquaculture project has, among its early primary tasks, the selection of the most suitable site for the farming business. Any error in the mariculture site selection and location evaluation stage can strongly influence the site's profitability, impacting on running costs and production capacity. Affects would also be noticed on fish mortality, health and welfare which, in combination, would make any longer-term fish farming unsustainable.

Prior to a site being selected and operations begun, the selection of suitable sites or zones for deploying the physical infrastructure necessary to grow fish in cages, requires a number of technical and environmental considerations,. This Atlas includes comprehensive information on various key themes and provides users with maps and satellite images showing where areas have been selected according to reliable information on the main site selection criteria within KSA. It should be noted that decisions over siting are often complex and require interpretation of data and specific ground surveys. For example, a site having good water flow will have wastes removed and oxygen in the cages replaced, although the site is likely to remain unsuitable if it is too shallow. Conversely a deep water site is useful, but not if the water flow is very low. Thus the areas selected in this Atlas should serve as background information for a more accurate site selection An exact identification of potential cage sites should be undertaken following a dedicated survey and then a proper siting performed according to the investor's production plans, target species and the technology to be adopted.

The areas selected for mariculture match the main site selection criteria as per the "Guidelines And Criteria On Technical And Environmental Aspects Of Cage Aquaculture Site Selection In The Kingdom Of Saudi Arabia" published under the FAO project UTF/SAU/048/SAU, and as much as possible are in compliance with the regulations in force within KSA. The aquaculture regulations issued through the Department of Aquaculture at the Ministry of Agriculture (MoA), plus other Environmental laws and Regulation issued through and administered by the Presidency Meteorology and Environment (PME), should take precedence when any errors or inconsistencies are identified.

In general this is an atlas to spatially support good site selection, with the provision of geo-referenced information on some of the main criteria that may allow for a reduction of conflicts with other coastal users. For investors who wish to establish marine cage aquaculture projects in the Red Sea, this Atlas will assist in the selection of the most appropriate areas.

It is currently the responsibility of the Ministry of Agriculture (MoA) in KSA to manage and develop aquaculture activities within the Kingdom of Saudi Arabia. A previous study, funded by the Agricultural Development Fund (ADF), working with the Ministry of Agriculture (MoA), was carried out to assess the potential carrying capacity for coastal and marine aquaculture development using spatial tools (e.g. remote sensing and Geographical Information Systems), plus the use of existing maps. The study (implemented by KPMG/Poseidon with FAO GIS consultant Justin Saunders) was to carry out a broad-scale assessment of carrying capacity for fisheries and to identify potential areas for cages and other culture systems by integrating oceanographic and other environmental information with available infrastructures and land facilities. The study also took into account potential conflicts such as urban development and the presence of sensitive habitats.

FAO identified that further capacity building within KSA was needed including the installation of GIS, training and continued study to identify potential aquaculture sites, carry out inventories of existing aquaculture activities and use spatial data to empower the Ministry of Agriculture (MoA) with adequate information on the overall developmental



**Food and Agriculture
Organization of the
United Nations**

الوزارة الزراعية
Ministry of Agriculture
المملكة العربية السعودية



Technical Cooperation Programme between the Ministry of Agriculture
and the Food and Agriculture Organization of the United Nations

Project UTF/SAU/048/SAU

"Strengthening and supporting further development of aquaculture in the Kingdom of Saudi Arabia"

ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

الزراعة
Ministry of Agriculture
المملكة العربية السعودية



Technical Cooperation Programme between the Ministry of Agriculture
and the Food and Agriculture Organization of the United Nations

Project UTF/SAU/048/SAU

"Strengthening and supporting further development of aquaculture in the Kingdom of Saudi Arabia"

ATLAS OF POTENTIAL AREAS FOR CAGE AQUACULTURE RED SEA - KINGDOM OF SAUDI ARABIA



Justin Saunders
Francesco Cardia
Mohammad Saad Hazzaa
Bahij Mohammed A. Rasem
Mohammad Ibrahim Othaibi
Mohammad Basil Rafiq