CEPHALOPODES

TEUTHOIDEA - CALMARS ET ENCORNETS

Coquille interne chitineuse, en forme de plume; 8 bras et 2 tentacules non retractiles

LOLIGINIDAE

Alloteuthis africana Adam, 1950


Noms FAO : **An** - African squid; **Es** - Calamarín africano; **Fr** - Casseron africain.

Taille max. : 19 cm (mâle), 9 cm (femelle) de longueur du manteau.


Méth.capt. : chaluts (prises secondaires).

Habitat : plateau continental, associée au fond où la ponte a lieu.

Noms loc. :



schema de la face orale de la couronne de bras et de la membrane buccale



mâte (vue dorsale)



femelle (vue dorsale)

Loligo vulgaris Lamarck, 1798

Noms FAO : **An** - European squid; **Es** - Calamar; **Fr** - Encornet.

Taille max. : 42 cm (mâle), 32 cm (femelle) de longueur du manteau.

Méth.capt.: chaluts de fond

Habitat : benthopélagique entre 20 et 250 m de profondeur, migrant vers la côte pour pondre.

Noms loc. :






schéma de la face orale de la couronne de bras et de la membrane buccale



vue ventrale du manteau



vue dorsale

LOLIGINIDAE

Lolliguncula mercatoris Adam, 1941


Noms FAO : **An** - Guinean thumbstall; **Es** - Calamar dedal de Guinea; **Fr** - Calmar doigtier de Guinée.

Taille max. : 3,5 cm (mâle), 5 cm (femelle), de longueur du manteau.

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : espèce côtière, sur fonds sableux et vaseux, à moins de 50 m de profondeur.

Noms loc. :



OMMASTREPHIDAE

Illex coindetii (Verany, 1837)


Noms FAO : **An** - Shortfin squid; **Es** - Pota voladora; **Fr** - Encornet rouge.

Taille max. : 22 cm (mâle), 26 cm (femelle) de longueur du manteau.

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : près de la côte, de préférence sur fonds de sable, mais se trouve aussi jusqu'à 1000 m de profondeur.

Noms loc. :



Ommastrephes bartrami (LeSueur, 1821)


Noms FAO : **An** - Flying squid; **Es** - Pota saltadora; **Fr** - Encornet volant.

Taille max. : femelles 50 cm; mâles un peu plus petits.

Méth.capt. : de valeur potentielle; capturée ailleurs avec des faux à calmar et des épuisettes (avec utilisation de la lumière).

Habitat : espèce océanique; de nuit près de la surface.

Noms loc. :



vue ventrale

Ommastrephes pteropus Steenstrup, 1855


Noms FAO : **An** - Orangeback squid; **Es** - Pota naranja; **Fr** - Encornet dos orange.

Taille max. : femelles 37 cm (longueur du manteau), mâles plus petits.

Méth.capt. : de valeur potentielle; capturée ailleurs avec des faux à calmar et des épuisettes (avec utilisation de la lumière).

Habitat : espèce océanique.

Noms loc. :



empreinte siphonale avec foveola et poches latérales (caractère du genre)

vue dorsale

Ornithoteuthis antillarum Adam, 1957


Noms FAO : **An** - Bird squid; **Es** - Pota pajarito; **Fr** - Encornet oiseau.

Taille max. : 20 cm, longueur du manteau.

Méth.capt. : faux à calmar, épuisettes, chaluts de fond (pendant le jour), chaluts pélagiques (la nuit).

Habitat : océanique, de la surface jusqu'à 1100 m de profondeur.

Noms loc. :



Todarodes sagittatus sagittatus (Lamarck, 1799)


Noms FAO : **An** - European flying squid; **Es** - Pota europea ; **Fr** - Toutenon commun.

Taille max. : 75 cm (mâles), 49 cm (femelles), de longueur du manteau.

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : de la surface jusqu'à 1000 m effectue des migrations vers la côte en grands bancs.

Noms loc. :



CEPHALOPODES

OMMASTREPHIDAE

Todaropsis eblanae (Ball, 1841)


Noms FAO : **An** - Lesser flying squid; **Es** - Pota costera; **Fr** - Encornet souffleur.

Taille max. : 16 cm (mâle), 24 cm (femelle), de longueur du manteau.

Méth.capt. : chaluts de fond (prises secondaires).

Habitat : espèce côtière, associée aux fonds sableux et vaseux, à des profondeurs de 20 à 650 m (à des températures de 9 à 18°C).

Noms loc. :



ONYCHOTEUTHIDAE

Ancistroteuthis lichtensteini (Orbigny, 1839)


Noms FAO : **An** - Angel squid; **Es** - Luria paloma; **Fr** - Cornet archange.

Taille max. : 30 cm, longueur du manteau.

Méth.capt. : chaluts pélagiques (prises secondaires).

Habitat : espèce pélagique, de la surface jusqu'à environ 250 m de profondeur.

Noms loc. :



ONYCHOTEUTHIDAE

Onychoteuthis banksi (Leach, 1817)


Noms FAO : **An** - Hooked squid; **Es** - Luria ganchuda; **Fr** - Cornet crochu.

Taille max. : 20 cm, longueur du manteau.

Méth.capt. : de valeur potentielle; pourrait être capturée avec des faux à calmar, et des filets soulevés (utilisation de la lumière).

Habitat : espèce océanique, de 150 à 800 m de profondeur.

Noms loc.



THYSANOTEUTHIDAE

Thysanoteuthis rhombus Troschel, 1857


Noms FAO : **An** - Rhomboid squid; **Es** - Chipirón volantín; **Fr** - Chipiloua commun.

Taille max. : 100 cm, commune jusqu'à 60 cm, longueur du manteau.

Méth.capt. : de valeur potentielle; pourrait être capturée avec des filets calés et des faux dérivants.

Habitat : espèce pélagique, vivant en petits bancs dans les eaux de surface; les valeurs nominales de sa distribution en profondeur sont inconnues.

Noms loc. :




CEPHALOPODES

OCTOPODA - PIEUVRES ET POULPES

Coquille interne réduite ou absente; 8 bras, pas de tentacules

OCTOPODIDAE

Octopus defilippi Verany, 1851



Noms FAO : **An** - Lilliput longarm octopus; **Es** - Pulpito patilago; **Fr** - Poulpe à longs bras.


Taille max. : 9 cm, longueur du manteau.

Méth.capt. : chaluts de fond (prises secondaires).

Habitat : benthique, sur fonds sableux et vaseux de 6 à 60 m de profondeur.

Noms loc. :

Octopus macropus Risson, 1826



Noms FAO : **An** - White-spotted octopus; **Es** - Pulpo patudo; **Fr** - Poulpe tacheté.


Taille max. : 100 cm de longueur totale, commune jusqu'à 80 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, engins artisanaux (harpons, crochets, leurres, pièges).

Habitat : fréquente les fonds rocheux coralliens de 1 à 20 m.

Noms loc. :

Octopus vulgaris Cuvier, 1797



Noms FAO : **An** - Common octopus; **Es** - Pulpo común; **Fr** - Pieuvre.

Taille max. : femelles jusqu'à 115 cm et mâles jusqu'à 130 cm (longueur totale), commune jusqu'à 2,5 kg (poids frais).

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : fréquente divers habitats de 0 à 200m.

Noms loc. :

Page Suivante