



17 JUILLET 2023: CRIQUETS AU YÉMEN

VUE D'ENSEMBLE. Vers début juillet, quelques petits groupes et essaims sont arrivés dans le nord du Yémen et ont traversé le pays avec la fin de la reproduction printanière et les opérations de lutte en Arabie saoudite. Cependant, les pluies sont très faibles et les conditions de reproduction ne sont actuellement pas favorables au Yémen, où des opérations de lutte se poursuivent. De même, certaines opérations de lutte ont été réalisées dans l'intérieur du Soudan. La reproduction estivale dans le Sahel septentrional, de la Mauritanie à l'ouest de l'Érythrée, sera probablement limitée en l'absence de nouvelles pluies.

SITUATION ACTUELLE. Des opérations de prospection et de lutte antiacridienne sont en cours dans certaines zones.

- **ALGÉRIE.** Ailés immatures épars dans les zones centrales (Adrar).
- **ARABIE SAOUDITE.** Quelques larves des derniers stades et ailés immatures, épars et en groupes, sont encore présents dans l'intérieur (Al Dawadimi, Bisha), ainsi que sur la côte centrale de la mer Rouge (Qunfidah). Quelques groupes d'ailés immatures dans l'intérieur (à l'est de Médine) et près de la côte de la mer Rouge (Djeddah, Lith, Qunfidah). Traitements sur une superficie de 1 135 ha.
- **INDE.** Adultes isolés sur un site au Rajasthan (Bikaner).
- **MAURITANIE.** Ailés solitaires immatures isolés dans le nord-ouest (d'Akjoujt à Atar) et le sud (d'Aleg à Kiffa).
- **PAKISTAN.** Quelques ailés solitaires immatures et matures dans le désert du Nara et du Cholistan, près de la zone indo-pakistanaise.
- **SOMALIE.** Ailés solitaires immatures isolés sur quelques sites de la côte nord-ouest et de l'escarpement.
- **SOUDAN.** Quelques groupes d'adultes dans les collines de la mer Rouge, ailés épars dans la vallée du Nil (de Dongola à Atbara), le long de la rivière Atbara (Kassala) et sur la côte. Des groupes larvaires du cinquième stade ont été traités dans la vallée du Nil à l'ouest d'Abu Hamed (400 ha).
- **YÉMEN.** Quelques essaims immatures en provenance du nord sont arrivés et se sont déplacés vers les hautes-terres (de Sa'dah à Ibb) et dans l'intérieur (d'Al Hazm à Marib), des groupes sont présents dans la vallée et le plateau de l'Hadramaout, ainsi que des ailés épars dans le sud (de Baihan à Ataq) et dans l'est de l'intérieur, près d'Oman. Des groupes et des essaims ont été traités à Al Hazm (1 470 ha).

PRÉVISIONS ACRIDIENNES. Prévisions jusqu'à la fin du mois.

- **RÉGION OCCIDENTALE.** Quelques pluies pourraient tomber sur des parties du sud de la Mauritanie, du nord du Mali et du Niger, du centre et du nord du Tchad, et du sud de l'Algérie. Cependant, ces précipitations seront inférieures à la normale. Par conséquent, la reproduction sera probablement limitée.
- **RÉGION CENTRALE.** Au Yémen, de petits groupes et quelques essaims se déplaceront probablement dans les hautes-terres, l'intérieur du pays et peut-être sur la côte. Il n'y aura pas de migration vers le nord-ouest de la Somalie ou la zone indo-pakistanaise. Jusqu'à fin août, les précipitations devraient être très faibles au Yémen ainsi qu'au Soudan, en Érythrée, en Arabie saoudite et dans le nord-ouest de la Somalie. Par conséquent, la reproduction sera limitée.
- **RÉGION ORIENTALE.** Quelques reproductions pourraient avoir lieu dans la zone indo-pakistanaise.

www.fao.org/ag/locusts

