



MISE A JOUR SUR LE CRIQUET PELERIN

FAO Centre d'Intervention Antiacridien d'Urgence



(26.7.2004)



Situation générale jusqu'au 26 juillet 2004

Davantage d'essaims sont arrivés ces deux dernières semaines en Mauritanie, au Sénégal et au Mali en provenance d'Afrique du Nord Ouest. L'arrivée d'essaims a été également signalée pour la première fois au Niger. Les pontes ont commencé dans certaines zones du Sahel. Aucun essaim n'a encore été signalé au Tchad et au Soudan. Des indicateurs laissent penser que la situation devient plus calme en Afrique du Nord Ouest où des opérations intensives de lutte continuent. Les efforts de lutte au Sahel sont entravés par le manque de ressources et la difficulté de localiser et traiter les essaims fortement mobiles. Plusieurs pays ont lancé de nouveaux appels à l'assistance internationale ; celle-ci est requise d'urgence pour compléter les efforts majeurs déjà déployés et pour éviter que la situation actuelle ne dégénère en une invasion généralisée.

À la mi-juillet, de nombreux essaims ont été observés en cours de déplacement vers le sud dans la région de l'Adrar au centre de la **Mauritanie**, causant des dommages aux palmiers dattiers. La plupart des essaims se sont dispersés dans l'ensemble des zones de reproduction estivale du sud de la Mauritanie entre Boutilimit et Kiffa. D'autres essaims ont continué vers l'est dans les Deux Hodhs et vers le sud dans le nord est du **Sénégal** (la vallée du fleuve Sénégal entre Matam et la frontière malienne) et vers l'ouest du **Mali** (près de Kayes et Niore). Les pontes ont commencé

bien plus au sud que d'habitude en Mauritanie, près du fleuve Sénégal à Guidimaka. La reproduction a aussi commencé à Assaba. Par conséquent, on s'attend à ce que les éclosions et la formation de bandes larvaires commencent fin juillet et menacent les cultures estivales. Les opérations de lutte terrestre ont concerné 1 731 ha en Mauritanie (11-20 juillet) et 872 ha au Sénégal. Dans le nord du Mali, de nombreux essaims sont arrivés dans l'Adrar des Iforas à la mi-juillet et certains d'entre eux ont continué vers le sud en direction du fleuve Niger. Bien que le Front Inter Tropical (FIT) oscille actuellement entre 15N et 20N, il y a un risque potentiel que quelques essaims puissent apparaître au **Burkina Faso** et dans l'ouest du Niger si le FIT descend en-dessous de 15N. Dans le nord du Niger, un essaim de grande taille a été observé le 20 juillet dans le Tamesna à l'ouest d'Agadez, ce qui semble indiquer que les premiers essaims d'Afrique du Nord Ouest ont commencé à arriver. Des reproductions localisées sont en cours dans les montagnes de l'Air, où des éclosions ont été signalées, et des ailés matures ont été observés dans le sud près de Zinder. Au vu des bonnes pluies qui sont tombées sur l'ensemble du Sahel et des conditions écologiques favorables, des reproductions à grand échelle vont bientôt commencer, augmentant ainsi davantage les effectifs acridiens en Afrique de l'Ouest.

Des opérations intensives de lutte terrestre et aérienne continuent au **Maroc** et en **Algérie** contre de nombreux essaims immatures qui persistent le long du versant sud des monts Atlas. Des dégâts aux cultures, localement importants dans certaines zones, se sont produits dans les deux pays. Pendant la deuxième décennie de juillet, le nombre d'hectares traités au Maroc a diminué (194,430 ha) ainsi qu'en **Libye** (213 ha), indiquant que la situation commence à s'améliorer dans les deux pays. Les opérations de lutte semblent progresser en **Tunisie** mais les détails

Le Bulletin FAO sur le Criquet pèlerin paraît chaque mois, complété par des mises à jour lors de périodes d'activité intense du Criquet pèlerin. Il est distribué par télécopie, courrier électronique, internet, valise FAO ou courrier par le Group Acridiens et Autres Migrateurs Nuisibles, AGP, FAO, 00100 Rome, Italie.

Téléphone: +39 06 570 52420 (7 jours/semaine, 24 hr)

Téléfax: +39 06 570 55271

E-mail: eclo@fao.org

Internet: www.fao.org

DLIS: www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm

ne sont pas disponibles. La situation devrait devenir calme dans la Région ces prochaines semaines.

Jusqu'à présent, aucun essaim en provenance de l'Afrique du Nord Ouest n'a été signalé au **Soudan** où seuls des ailés épars sont présents dans les zones de reproduction estivale à l'ouest du Nil.

L'information la plus récente sur la situation et des photographies sont disponibles sur Internet (www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm) ainsi que des cartes illustrant les infestations les plus récentes (193.43.36.11/mapper).