

Tableau 8. Liste des ingrédients alimentaires supplémentaires communément utilisés dans l'élevage de tilapia.
(teneurs nutritionnelles fournies en % en tant que base alimentaire)

Ingrédients alimentaires	Composition nutritionnelle					TCA estimé
	Humidité	Protéines brutes	Lipides bruts	Cendres	Energie brute (kJ/g)	
Aliments d'origine animale						
Farine de sang	10,4	81,5		2,0	20,0	1,5 - 1,7
Chironomidae frais	84,0	9,0	14,0	7,0	7,5	2,3 - 4,4
Daphnies fraîches	89-94	3 - 7,5			1,2 - 2,5	4 - 6,4
Lombrics frais	81,1	10,6	2,0	3,0	3,1	8 - 10
Farine de poisson	7 - 9	57 - 72,7	4 - 9	10-26	16,8 - 20,7	1,5 - 3,0
Foie, rate	70 - 73	20,2 - 20,5			6,7 - 7,3	5,5 - 8,0
Criquets séchés	10,5	46,2			20,5	5,0
Criquets frais	68,2	22,1			7,1	10,7
Déchets de poissons bruts	52-83	11-26	1 - 36	1-2		4 - 9
Farine de viande	6,9	53,0		31,1	16,8	2,0
Viscères fraîches de volailles	74,0	14,0	11,0	1,0		5 - 8
Chrysalides fraîches de vers à soie	10,0	55,9		1,9	24,2	1,3 - 2,1
Chrysalides séchées de vers à soie	74,9	13,7	8,0	1,2	6,9	3 - 5
Chaire sèche d'escargots	5,7	62,7			20,6	10,2
Chaire fraîche d'escargots	78,0	12,0	1,0	4,0	4,0	22,0
Aliments d'origine végétale						
Feuilles de bananier	75,0	2,4	1,0		4,7	25,0
Feuilles de manioc	74,4	7,7	1,0	2,0	4,9	10 - 20
Maïs	12,2	9,6	4,0	2,0	16,3	4 - 6
Tourteaux de graines de coton	7,8 - 10,7	21,9 - 41,2		8,3	16,9 - 18,7	3,0
Riz moulu	11,3	7,5	0,6	0,6	15,8	4,5
Tourteaux d'arachide	9,6 - 10	30,2 - 46,2	9,0	8,6	6,7 - 9,1	2 - 4
Tourteaux d'huile de palme	10,5	17,7	10,0	3,3	18,0	6 - 12
Ivraie	88,3	2,9			15,1	17 - 23
Soja	8,8 - 9,1	24,1 - 37,8	10,0	7,0	18,3 - 21,2	3 - 5
Jacinthe d'eau	91,5	1,2	0,3	1,0	1,4	50,0
Son de blé	12,1	14,7	4,0	5,5	16,0	6,1 - 7,3
Farine de blé	12,0	11,7	1,0	0,5	16,1	7,2

* TCA Taux de conversion alimentaire

Sources des données: Tacon (1987b); Tacon (1988)