

Tabla 21. Fórmulas de alimentos (composición de ingredientes, % de materia seca) y composición proximal de alimentos pelletizados comúnmente utilizados en diferentes etapas de vida de la tilapia del Nilo en sistemas de cultivo intensivo

		Etapas de vida				
		Crecimiento	Crecimiento	Crecimiento	Crecimiento	Reproductor
		1	2	3	3	2
<b>Composición de ingredientes (%)</b>						
	Torta de copra				17	
	Torta de semilla de algodón	20			20	
	Solubles secos de cerveza	10				
	Pescado seco			25		
	Aceite de pescado				3	
	Harina de pescado	5			9	
	Pasta de maní	10			11	
	Harina hidrolizada de plumas	3				
	Torta de gérmen de maíz		7.34			
	Gluten de maíz					10
	Harina de carne	5				
	Melaza		5	15		5
	Concha de ostión				2	
	Salvado de arroz	39				
	Harina de semilla de cárcamo					10
	Sorgo		15			15
	Soya (entera)		54	20		43.8
	Harina de soya					3.15
	Torta de soya	4				
	Torta de girasol			20		
	Harina de semilla de girasol		11.07			9.8
	Trigo					
	Harinilla de trigo			20	38	
	Salvado de trigo		3			
	Premezcla vitamínica*	1	0.6	1		0.6
	Premezcla mineral**	3	0.1			0.1
	L-Lisina					0.29
	Ortofosfato de calcio		1.35			1.6
	Polvo de piedra caliza		2.54			0.66
<b>Composición proximal (%)</b>						
	Materia seca			92	91.2	
	Proteína cruda	30	26.9	33.3	28	30
	Lípidos crudos	8	10		6.5	8.5
	Ceniza			10.5	9.3	
	Fibra cruda		8		12.8	8.5
	Energía bruta (kJ/g de alimento)		11.7			11.7

\*Ver Tablas 24 y 25 para más detalles sobre premezclas de vitaminas y minerales más utilizadas

Fuentes: (1) Jauncey and Ross (1982); (2) ADCP (1983); (3) Tacon (1987)