



GENERAL FISHERIES COMMISSION  
FOR THE MEDITERRANEAN  
COMMISSION GÉNÉRALE DES PÊCHES  
POUR LA MÉDITERRANÉE

**F****COMMISSION GÉNÉRALE DES PÊCHES POUR LA MÉDITERRANÉE****Trente-deuxième session****Rome, Italie, 25-29 février 2008****INVENTAIRE ET SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE CONCERNANT  
LA PÊCHE ET LA BIODIVERSITÉ DES ZONES DE MER PROFONDE****I. INTRODUCTION**

1. Ce document, réalisé à la demande faite par la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM) durant sa trentième session (Rome, 2007), a pour objectif de présenter un inventaire et synthèse bibliographique concernant la pêche et la biodiversité des zones de mer profonde permettant au Comité scientifique consultatif de la CGPM de planifier pour les actions futures à entreprendre dans le domaine d'étude des pêcheries et de la biodiversité des eaux profondes de la Méditerranée et de la mer noire. Le document a été rédigé par Mr. Chedly Rais.

**Inventaire et synthèse bibliographique concernant la pêche  
et la biodiversité des zones de mer profonde**

**Par**

**Chedly Rais**

**Janvier 2008**

## SOMMAIRE

	Pages
Liste des acronymes .....	3
Introduction .....	4
Méthodologie et résultat de l'inventaire .....	4
Définition des zones de mer profonde .....	5
Principaux éléments de la biodiversité des mers profondes en Méditerranée .....	6
Mégafaune des zones profondes de la Méditerranée.....	6
Principales menaces sur les écosystèmes profonds décrites dans la bibliographie .....	6
Etat des connaissances sur la biodiversité des zones profondes.....	6
Données sur l'activité de pêche dans les zones profondes .....	7
Principales lacunes au niveau des données sur les ressources vivantes des zones profondes en Méditerranée.....	8
Principales zones étudiées.....	8
La recommandation CGPM/2005/ .....	9
Critères pour le classement de zones marines profondes en AMP .....	9
Liste des publications inventoriées.....	11

## Liste des acronymes

ASPIM : Aire Spécialement Protégée d'Intérêt Méditerranéen

CAR/ASP : Centre d'Activités Régionales pour l Aires Spécialement Protégées

CDB : Convention sur la Diversité Biologique

CGPM : Commission Générale des Pêche pour la Méditerranée

CIESM : Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée

ICES : International Council for the Exploration of the Sea

OMI : Organisation Maritime Internationale

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

UICN : Union Mondiale pour la Nature

WWF : Fonds Mondial pour la Nature

:

## **Introduction**

Globalement, les zones de mer profondes sont relativement peu étudiées et les données scientifiques qui les concernent restent limitées. Il est vrai que de nombreuses publications sont disponibles, mais elles sont souvent ponctuelles dans le temps et dans l'espace. Par ailleurs la difficulté d'accès et d'échantillonnage dans ces milieux font que le nombre de chercheurs et d'institutions qui travaillent sur la biodiversité des mers profondes est relativement réduit. En outre, le régime juridique d'une grande partie des zones profondes fait que l'appui logistique et financier pour travailler sur ces zones n'est pas disponible pour des chercheurs de nombreux pays.

Depuis quelques années la question de l'exploitation et la conservation des ressources des zones de mers profondes est traitée au niveau d'instances internationales telles que la CDB et l'OMI et certaines organisations internationales ont encouragé l'élaboration de documents sur ces zones. Le plus récent de ces documents a été publié conjointement par l'UICN et le PNUE en 2006, il décrit les richesses des zones profondes et de haute mer de la planète et traite de leur conservation.

Pour la zone Méditerranée, un document conjoint de l'UICN et de WWF a été publié en 2004. Ce document fournit une description détaillée des principaux éléments de la biodiversité des zones profondes en Méditerranée et traite de quelques considérations relatives à l'exploitation et la conservation de leurs ressources.

Le présent document a été élaboré à la demande de la CGPM qui a invité son Comité Scientifique Consultatif de réaliser un inventaire et une synthèse de la documentation disponible relative aux zones de mers profondes. Une version préliminaire du document a été présentée lors de la réunion du Sous-Comité de l'Environnement et des Ecosystèmes Marins (Kavala, Grèce, 17-20 septembre 2007). Le sous-comité a notamment recommandé de focaliser sur les publications récentes et d'ajouter une section traitant des lacunes en matière de connaissances pertinentes pour la pêche.

### **1. Méthodologie et résultat de l'inventaire**

L'essentiel de l'inventaire a été réalisé à travers des recherches sur Internet et l'analyse des documents de synthèse disponibles. A cet effet une base de données a été élaborée où les publications identifiées comme ayant un lien direct avec la biodiversité et l'exploitation des zones profondes ont été répertoriées. La base de données a été organisée de façon à pouvoir effectuer des classifications des publications répertoriées par sujet et par zone géographique.

Considérant l'objectif de ce travail, nous n'avons pas restreint l'inventaire aux publications qui traitent de la Méditerranée, nous avons toutefois accordé une attention particulière aux publications relatives à la Méditerranée.

Deux cent cinquante (250) publications ont été ainsi recensées et analysées dans le cadre de ce travail. Elles présentent une grande diversité de sujets et d'approches. Il est à noter que plusieurs de ces publications ne sont pas basées sur des investigations de terrain.

La liste des publications inventoriées est présentée par ordre alphabétique des auteurs à la fin du présent document.

Une grande partie de la documentation recensée est relativement récente. Voici ci-après leur répartition selon l'année de publication.

Avant 1970 : 3 publications. Elles ont les numéros suivants dans la liste inventaire figurant à la fin de ce document : 184, 203, 207

Pendant les années 70 : 8 publications. Elles ont les numéros suivants dans la liste inventaire figurant à la fin de ce document : 27, 58, 105, 110, 145, 161, 200, 242

Pendant les années 80 : 24 publications. Elles ont les numéros suivants dans la liste inventaire figurant à la fin de ce document : 2, 7, 72, 89, 90, 104, 109, 111, 119, 127, 128, 137, 151, 176, 177, 183, 198, 210, 229, 234, 243, 244, 246, 250

Pendant les années 90 : 88 publications. Elles ont les numéros suivants dans la liste inventaire figurant à la fin de ce document : 1, 10, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 103, 106, 108, 112, 113, 117, 120, 130, 133, 140, 144, 146, 152, 154, 156, 160, 162, 165, 166, 168, 170, 173, 175, 178, 180, 182, 192, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 219, 222, 223, 224, 225, 235, 241, 245, 248

De 2000 à 2005: 110 publications. Elles ont les numéros suivants dans la liste inventaire figurant à la fin de ce document : 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 28, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 64, 68, 69, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 92, 98, 100, 101, 102, 107, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 134, 135, 136, 139, 142, 143, 147, 148, 150, 153, 155, 157, 158, 159, 164, 167, 169, 172, 174, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 196, 197, 199, 201, 202, 204, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 221, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240

En 2000 et 2007: 17 publications. Elles ont les numéros suivants dans la liste inventaire figurant à la fin de ce document : 26, 79, 80, 114, 115, 124, 129, 138, 141, 149, 163, 171, 181, 194, 218, 247, 249,

### **Définition des zones de mer profonde**

Certains auteurs et organisations considèrent comme zones profondes, les zones situées au-delà du plateau continental. Ceci ne fait pas l'unanimité chez les spécialistes, en effet les définitions disponibles dans la bibliographie comportent des différences relativement importantes et il est donc difficile d'établir une définition qui tient compte de toutes les définitions proposées. Le principal point de divergence concerne la profondeur à partir de laquelle les zones marine sont considérées comme zones profondes. Selon les auteurs et les organisations, cette profondeur varie de 200 à 400 mètres. Par exemple, pour l'ICES, la zone de mer profonde commence à partir de -400 de profondeur.

## **Principaux éléments de la biodiversité des mers profondes en Méditerranée**

Le document publié conjointement par l'UICN et le WWF en 2004 "The Mediterranean deep-sea ecosystems: an overview of their diversity, structure, functioning, and anthropogenic impacts, with a proposal for their conservation" fournit une excellente synthèse sur les éléments constitutifs de la biodiversité marine recensés dans les zones profondes de la Méditerranée. Il ressort de cette synthèse que le taux d'endémisme des espèces des zones profondes connues en Méditerranée est, pour plusieurs taxons, supérieur au taux d'endémisme moyen en Méditerranée, qui est connu pour être un des plus élevés des océans et mers de la planète.

## **Mégafaune des zones profondes de la Méditerranée**

La mégafaune des zones profondes méditerranéennes est dominée par les poissons et les crustacés décapodes. Globalement la diversité d'espèces ainsi que leur abondance sont inversement proportionnelles à l'augmentation de la profondeur. Toutefois, certains auteurs décrivent une augmentation de la biomasse dans les profondeurs situées entre 1000 et 1500m.

## **Principales menaces sur les écosystèmes profonds décrites dans la bibliographie**

Les activités de pêche constituent la principale menace décrite dans la bibliographie pour les zones profondes. C'est notamment la sur-pêche et l'effet destructeur de certains engins, notamment les chaluts qui sont souvent cités. Pour certains auteurs le chalutage benthique est responsable de la destruction de 98% des coraux des montagnes sous-marines à travers le monde.

La pollution est aussi citée comme menace et en particulier les rejets en mer de déchets solides. Certains auteurs rapportent que des navires se débarrassent en mer de leurs propres déchets, ce qui est contraire aux règlements de l'OMI en la matière. D'autres auteurs indiquent que le dépôt en haute mer de produits toxiques est une pratique encore courante.

La mise en place de câbles et de pipelines est aussi signalée comme une menace potentielle pour les écosystèmes des zones marines profondes.

Pour les activités pétrolières, pendant longtemps la technologie n'était pas disponible pour la réalisation d'activités pétrolières dans les zones profondes. Toutefois, d'après quelques auteurs, cette technologie est désormais disponible et plusieurs compagnies opèrent à des profondeurs de plus de 3000 mètres. Évidemment, de telles activités constituent des menaces sérieuses pour les écosystèmes des zones profondes et ce à travers l'action physique directe des équipements utilisés et aussi les pollutions engendrées. Certains auteurs soulignent que les techniques d'interventions en cas d'accidents pétroliers en grandes profondeurs sont pratiquement inexistantes.

## **Etat des connaissances sur la biodiversité des zones profondes**

Pour toutes les mers du globe, il est largement admis que nos connaissances sur les écosystèmes des zones profondes sont relativement faibles. La biodiversité de ces zones est

parmi les aspects les moins étudiés et les données y relatives sont souvent incomplètes pour permettre d'établir des diagnostics fiables des éléments constitutifs de cette biodiversité. Pour la Méditerranée, les données disponibles sont encore faibles, mais l'information disponible dans la bibliographie permet déjà de dresser des inventaires qualitatifs, toutefois les données sur la distribution géographique qui font défaut. En effet la majorité des publications analysées dans le cadre du présent travail se contentent de fournir des descriptions des habitats et des espèces.

Pour ce qui est des sujets traités par les publications, nous avons recensé une dizaine de thèmes liés à la biodiversité et au fonctionnement des écosystèmes des zones marines profondes. Le classement de ces thèmes selon le nombre de publications recensées est comme suit:

1. Biologie des espèces
2. Sciences de la Terre
3. Océanographies
4. Ecologie
5. Microbiologie
6. Zoologie
7. Hydrobiologie
8. Biomédecine
9. Géophysique/Géodésie
10. Géologie

Pour la Méditerranée on trouve les mêmes thèmes avec une classification légèrement différente:

1. Biologie des espèces
2. Ecologie
3. Sciences de la Terre
4. Océanographie
5. Microbiologie
6. Zoologie
7. Biomédecine
8. Hydrobiologie
9. Géologie
10. Géophysique/Géodésie

### **Données sur l'activité de pêche dans les zones profondes**

Dans la documentation recensée, les données sur l'activité de pêche en zones profondes en Méditerranée sont rares. L'analyse bibliographique réalisée dans le cadre du présent travail montre que les zones méditerranéennes de mer profonde renferment de nombreuses ressources d'intérêt pour l'exploitation. Toutefois, comparée à d'autres milieux et notamment l'Océan Atlantique, les zones profondes méditerranéennes sont moins riches en terme de biomasse vivante.

Pour la pêche, les contraintes liées aux difficultés technologiques et à l'éloignement d'une grande partie des zones profondes font que l'exploitation de telles ressources reste limitée. Le chalutage de fond fournit environ 80% des prises réalisées en zones profondes. Cependant l'apport de cette pêche ne représente pas plus de 0,25% de la pêche mondiale sur le plan de tonnages débarqués et 0,5% de la valeur (données de 2001).

L'espèce la plus importante est la crevette rose *Parapenaeus longirostris* (Lucas, 1846). Cette espèce est pêchée dans plusieurs endroits de la Méditerranée entre 200 et 300 m de profondeur. Mais d'après certains auteurs cette espèce est présente entre 20 et 750 m de profondeur. A cause de la valeur économique de cette espèce plusieurs auteurs se sont intéressés à étudier sa biologie et son écologie ainsi que sa pêche.

La documentation disponible ne contient pas de données sur les tonnages d'espèces pêchées en zones profondes. Il ressort cependant d'études faites dans certaines zones de la Méditerranée occidentale que des fluctuations interannuelles sont enregistrées pour la crevette rose *Parapenaeus longirostris*.

### **Principales lacunes au niveau des données sur les ressources vivantes des zones profondes en Méditerranée**

La documentation recensée dans le cadre de ce travail fourni peu d'information sur les ressources vivantes des zones profondes méditerranéennes notamment en termes quantitatifs et de répartition géographique. Le type d'information disponible ne permet pas d'évaluer les potentialités d'exploitation de ces zones. En effet si des données existent sur l'exploitation actuelle de certaines espèces (notamment de crevettes), les données sur l'évaluation de stocks ou sur les rendements horaires de chalutage ne sont pas disponibles. De même le fonctionnement des écosystèmes des zones profondes est peu étudié. Comblé de telles lacunes nécessite un grand effort de prospection à travers de campagnes de terrain. Vu l'ampleur de la tâche, le développement campagnes conjointes entre plusieurs pays pourrait contribuer à améliorer nos connaissances sur ces milieux.

### **Principales zones étudiées**

En termes de nombre de publications recensées, les zones de mer profonde les plus étudiées en Méditerranées sont les suivantes:

Zone de la Catalogne: 17 publications. Elles ont les numéros suivants dans la liste inventaire figurant à la fin de ce document: 2, 9, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 67, 89, 213, 214, 223, 224

Mer Ionienne: 12 publications. Elles ont les numéros suivants dans la liste inventaire figurant à la fin de ce document: 26, 62, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 186, 216, 228, 239

Zone des Baléares: 7 publications. Elles ont les numéros suivants dans la liste inventaire figurant à la fin de ce document: 5, 25, 35, 45, 157, 168, 216

Zone de la Crète: 6 publications. Elles ont les numéros suivants dans la liste inventaire figurant à la fin de ce document: 67, 68, 117, 126, 196, 237

Mer Égée: 5 publications. Elles ont les numéros suivants dans la liste inventaire figurant à la fin de ce document: 51, 134, 170, 235, 237

Zone Ligure: 5 publications. Elles ont les numéros suivants dans la liste inventaire figurant à la fin de ce document: 86, 176, 178,198, 199

### **La recommandation CGPM/2005/1**

Lors de sa 29<sup>ème</sup> session, la CGPM a adopté la recommandation CGPM/2005/1 concernant la gestion des pêcheries exploitant les espèces démersales et des eaux profondes. Concernant les eaux profondes, la dite recommandation stipule que les membres de la CGPM interdiront les engins traînants et la pêche au chalut dans les profondeurs dépassant -1000 m. La recommandation stipule aussi que le Comité Scientifique procèdera à l'évaluation de l'impact des mesures prises et proposera si nécessaire d'éventuels ajustements des mesures ou de nouvelles mesures qui s'avèrent nécessaires.

D'après la documentation disponible, la pêche au chalut n'est pas pratiquée en Méditerranée au-delà de -800 m de profondeur. L'application de la dite interdiction décidée par la CGPM en 2005 est donc relativement facile à appliquer pour le moment. D'ailleurs quelques pays, ont déjà transcrit cette interdiction dans leurs réglementions suite à la recommandation CGPM/2005/1. Celle-ci est donc une mesure de précaution qui dissuadera l'éventuel développement de la pêche dans les grandes profondeurs en Méditerranée.

En vue d'avoir une idée plus précise sur l'étendue et les perspectives de développement de la pêche en zones profondes en méditerranée, il serait fort utile de recenser la flottille de pêche utilisant des arts traînants dans les profondeurs situées entre -400 et -1000 m et de collecter les données sur leurs captures et d'analyser quantitativement et qualitativement les rejets de cette pêcherie.

Pour ce qui est de la protection des éléments fragiles de la biodiversité des zones profondes, il serait judicieux d'instaurer une collaboration entre la CGPM et le CAR/ASP concernant la préservation du coralligène. Il est à noter à ce sujet qu'un plan d'action sur le coralligène a été développé par le CAR/ASP et il sera soumis pour adoption par les Parties contractantes à la convention de Barcelone en janvier 2008. La mise en place d'ASPIM pour la préservation de zones de mer profondes en Méditerranée est un autre sujet de collaboration possible entre la CGPM et le CAR/ASP.

### **Critères pour le classement de zones marines profondes en AMP**

Considérant leur importance écologique, certaines zones marines pourraient être classées en aires marines protégées. Les critères de classement proposés ci-après ont été identifiés sur la base des principaux éléments de la biodiversité des zones profondes méditerranéennes décrits dans la bibliographie disponible :

- Présence d'un ou de plusieurs des éléments suivants :
  - Suintements froids (Habitats à Chimiosynthèse)
  - Ressources sursalées (Brine pools)
  - Monticules de corail de mer profonde
  - Monts sous marins

- Présence d'espèces d'importance méditerranéenne
- Existence de phénomènes océanographiques important pour les ressources vivantes en méditerranée (zones d'upwelling, formation des masses d'eau dense, zone de séquestration du Carbone, etc.)
- Importance sur le plan scientifique et/ou de la recherche
- Existence de menaces pouvant compromettre la conservation à long terme des potentialités en ressources naturelles de la zone

En plus de ces critères il est important de tenir compte de considérations liées au statut de la zone en terme de juridiction des Etats ainsi que des possibilités réelles de mise en œuvre et d'application des mesures de protection envisagées.

## Liste des publications inventoriées

La liste est présentée selon l'ordre alphabétique des auteurs.

- 1 ABELLÓ, P. and J. E. CARTES (1992) - Population characteristics of the deep-sea lobsters *Polycheltes typhlops* and *Stereomastis sculpta* (Decapoda, Polychelidae) in the Mediterranean bathyal mud community  
Marine Biology - 14: 109-117.  
Thème(s): MUD COMMUNITY, DEEP-SEA, POLYCHELES, DECAPODA, MEDITERRANEAN BATHYAL
- 2 ABELLÓ, P., F. J. VALLADARES and A. CASTELLÓN (1988) - Analysis of the structure of decapod crustacean assemblages off the Catalan coast (North-West Mediterranean)  
Marine Biology - 98:39-49.  
Thème(s): CRUSTACEAN ASSEMBLAGES, CATALAN COAST
- 3 ABELLÓ, P., UNGARO, N. POLITOU, C.-Y., TORRES, P., ROMAN, E., RINELLI, P. (2001) - Notes on the distribution and biology of the deep-sea crab *Bathynectes maravigna* (Brachyura: Portunidae) in the Mediterranean Sea  
Hydrobiologia - 449: 187-192, 2001.  
Thème(s): BATHYNECTES MARAVIGNA, DISTRIBUTION, BIOLOGY, MEDITERRANEAN SEA
- 4 ABELLÓ, P., ARCOS, J. M., GIL DE SOLA, L., (2003) - Geographical patterns of seabird attendance to a research trawler along the Iberian Mediterranean coast  
Science Marine - 67(suppl. 2):69-75.  
Thème(s): IBERIAN MEDITERRANEAN COAST
- 5 ACOSTA, J., A. MUÑOZ, P. HERRANZ, C. PALOMO, M. BALLESTEROS, M. VAQUERO and E. UCHUPI (2001) - Pockmarks in the Ibiza Channel and western end of the Balearic Promontory (western mediterranean) revealed by multibeam mapping.  
Geo-Marine Letters, - 21 (3): 123-130.  
Thème(s): IBIZA CHANNEL, POCKMARKS, MULTIBEAM MAPPING
- 6 BACHELET, G., J.-C. DAUVIN and J.-C. SORBE (2003) - An updated checklist of marine and brackish water Amphipoda (Crustacea: Peracarida) of the southern Bay of Biscay (NE Atlantic)  
Cahier de Biologie Marine - 44(2): 121-151.  
Thème(s): BRACKISH WATER AMPHIPODA, SOUTHERN BAY OF BISCAY
- 7 BARRIER P., I. DI GERONIMO, CH. MONTENAT, M. ROUX and H. ZIBROWIUS (1989) - Présence de faunes bathyales atlantiques dans le Pliocène et le Pleistocène de Méditerranée (détroit de Messine, Italie)  
Bulletin de la Société de Géologie de France - 8(4): 787-796.  
Thème(s): FAUNES BATHYALES, MEDITERRANEE

- 8 BAS, C (2002) - El mar mediterráneo: recursos vivos y explotación  
Ed. Ariel, Barcelona - 518 pp.  
Thème(s): FISHERIES, DEEP-SEA SPECIES
- 9 BAS, C., MAYNOU, F., SARDÀ, F., LLEONART, J (2003) - Variacions demogràfiques a les poblacions d'espècies demersals explotades  
Institut d'Estudis Catalans, Barcelona. - 202 pp.  
Thème(s): ESPECIES DEMERSALS, MEDITERRANEAN SEA
- 10 BELLAN-SANTINI, D (1990) - Mediterranean deep-sea Amphipoda: composition, structure and affinities of the fauna.  
Prog. Oceanogr - 24: 275-387.  
Thème(s): MEDITERRANEAN, DEEP-SEA, AMPHIPODA
- 11 BAILEY, D. M., BAGLEY, M., JAMIESON, A. J (2005) - Life in a warm deep sea: routine activity and burst swimming performance of the shrimp *Acanthephyra eximia* in the abyssal Mediterranean  
Marine Biology - 146: 1199–1206  
Thème(s): ACANTHEPHYRA EXIMIA, ROUTINE ACTIVITY, BURST SWIMMING, DEEP SEA, MEDITERRANEAN SEA
- 12 BIANCHINI, M. L. & S. RAGONESE (1994) - Life cycles and fisheries of the deep-water red shrimps *Aristaeomorpha foliacea* and *Aristeus antennatus*  
NTR-ITPP Spec. Publ - 3:1-87.  
Thème(s): RED SHRIMPS, ARISTAEOMORPHA FOLIACEA, ARISTEUS ANTENNATUS, DEEP-WATER
- 13 BILLET, D. S. M., B. J. BETT, A. L. RICE, M. H. THURSTON, J (2001) - Long-term change in the megabenthos of the Porcupine Abyssal Plain (NE Atlantic)  
Prog. Oceanogr., - 50: 325-348.  
Thème(s): CHANGE, MEGABENTHOS, PORCUPINE ABYSSAL PLAIN
- 14 BLEND, C.K., DRONEN, N.O., ARMSTRONG, H.W, (2000) - Six new species of *Lepidapedon* Stafford, 1904 (Digenea: Lepocreadiidae) from deep-sea macrourid fishes from the Gulf of Mexico and Caribbean Sea, with revised keys to the species of the genus  
Systematic Parasitology - 45: 29–51, 2000.  
Thème(s): NEW SPECIE, LEPIDAPEDON STAFFORD, DEEP-SEA, GULF OF MEXICO, CARIBBEAN SEA
- 15 BORGHI, V. and C. PORTE (2002) - Organotin Pollution in Deep- Sea Fish from the NW Mediterranean.  
Environ. Sci. Technol - 36(20): 4224-4228.  
Thème(s): DEEP- SEA, FISH, ORGANOTIN POLLUTION
- 16 BOUCHET, PH. and M. TAVIANI (1992) - The Mediterranean deepsea fauna: pseudopopulations of Atlantic species?  
Deep-Sea Res. - 39(2): 169-184.  
Thème(s): MEDITERRANEAN, DEEPSEA FAUNA, ATLANTIC SPECIES

- 17 BOUILLON, J., F. PAGÈS, J.-M. GILI, A. PALANQUES, P. PUIG (2000) - Deep-water Hydromedusae from the Lacaze-Duthiers submarine canyon (Banyuls, northwestern Mediterranean) and description of two new genera, *Guillea* and *Parateclaia*.  
 Sci. Mar - 64 (suppl. 1): 87-95.  
Thème(s): DEEP-WATER, LACAZE-DUTHIERS SUBMARINE CANYON, NEW GENERA
- 18 BOZZANO, A. and F. SARDÀ (2002) - Fishery discard consumption rate and scavenging activity in the northwestern Mediterranean Sea  
 ICES J. Mar. Sci. - 59(1): 15-28.  
Thème(s): NORTH WESTERN MEDITERRANEAN SEA, DISCARDS
- 19 BRANDT, A., ELLINGSEN, K. E., BRIX, S., BROKELAND, W., MALYUTINA, M., (2005) - Southern Ocean deep-sea isopod species richness (Crustacea, Malacostraca): influences of depth, latitude and longitude  
 Polar Biol - 28: 284–289  
Thème(s): SOUTHERN OCEAN, DEEP-SEA, ISOPOD SPECIES RICHNESS
- 20 BUSCAIL, R. and C. GERMAIN (1997) - Present-day organic matter sedimentation on the NW Mediterranean margin: importance of off-shelf export  
 Limnol. Oceanogr. - 42(2):217-229.  
Thème(s): ORGANIC MATTER, MEDITERRANEAN MARGIN
- 21 BUSCAIL, R., POCKLINGTON, R., DAUMAS R. and L. GUIDI (1990) - Fluxes and budget of organic matter in the benthic boundary layer over the northwestern Mediterranean margin.  
 Cont. Shelf Res. - 10: 1089-1112.  
Thème(s): ORGANIC MATTER, MEDITERRANEAN MARGIN
- 22 CAMBON-BONAVITA, M.A, LESONGEUR, F., PIGNET, P., WERY, N., LAMBERT, C., GODFROY, A., QUERELLOU, J., BARBIER, G., (2003) - Extremophiles, Thermophily section, species description *Thermococcus atlanticus* sp. nov., a hyperthermophilic Archaeon isolated from a deep-sea hydrothermal vent in the Mid-Atlantic Ridge  
 Extremophiles - 7:101–109  
Thème(s): HYDROTHERMAL, THERMOPHILES, THERMOCOCCUS, MID-ATLANTIC RIDGE, PROTEOLYSIS
- 23 CAMPILLO C. (1994) - Bio-ecology of *Aristeus antennatus* in the French Mediterranean.  
 NTR-ITPP Spec. Publ., - 3: 25-26.  
Thème(s): ARISTEUS ANTENNATUS
- 24 CARBONELL, A., P. MARTÍN, S. DE RANIERI and WEDIS TEAM, (1998) - Discards of the Western Mediterranean trawl fleet.  
 Rapp. Comm. int. Mer Médit. - 35: 392-393.  
Thème(s): WESTERN MEDITERRANEAN, TRAWLING, DISCARDS

- 25 CARBONELL, A., M. CARBONELL, M. DEMESTRE, A. GRAU and S. MONTSERRAT (1999) - The red shrimp *Aristeus antennatus* (Risso, 1816) fishery and biology in the Balearic Islands, Western Mediterranean.  
Fish. Res. - 44: 1-13.  
Thème(s): RED SHRIMP, ARISTEUS ANTENNATUS, FISHERY, BIOLOGY, BALEARIC ISLANDS
- 26 CARLUCCI, R., D'ONGHIA, G., SION, L., MAIORANO, P., & A. TURSI (2006) - Selectivity parameters and size at first maturity in deep-water shrimps, *Aristaeomorpha foliacea* (Risso, 1827) and *Aristeus antennatus* (Risso, 1816), from the North-Western Ionian Sea (Mediterranean Sea)  
Hydrobiologia - 557:145–154  
Thème(s): TRAWL SELECTIVITY, SIZE AT FIRST CAPTURE, SIZE AT FIRST MATURITY, ARISTAEOMORPHA FOLIACEA, ARISTEUS ANTENNATUS, MEDITERRANEAN SEA
- 27 CARPINE, C. (1970) - Ecologie de l'étage bathyal dans la Méditerranée occidentale.  
Mém. Inst. Océanog. Monaco. - 2: 1-146.  
Thème(s): ECOLOGIE, ETAGE BATHYAL, MEDITERRANEE OCCIDENTALE
- 28 CARRASSÓN, M. and J. E. CARTES (2002) - Trophic relationships in a Mediterranean deep-sea fish community: partition of food resources, dietary overlap and connections within the Benthic Boundary Layer.  
Mar. Ecol. Prog. Ser., - 241:41-55.  
Thème(s): TROPHIC RELATIONSHIPS, DEEP-SEA FISH COMMUNITY, MEDITERRANEAN
- 29 CARTES, J. E. (1993) - Deep-sea decapod fauna of the western Mediterranean: bathymetric distribution and biogeographic aspects  
Crustaceana, - 65: 29-40.  
Thème(s): DEEP-SEA, DECAPOD FAUNA, WESTERN MEDITERRANEAN, BATHYMETRIC
- 30 CARTES, J. E. (1994) - Influence of depth and season on the diet of the deep-water aristeid *Aristeus antennatus* along the continental slope (400 to 2300 m) in the Catalan Sea.  
Mar. Biol. - 120: 639-648.  
Thème(s): DEPTH, DEEP-WATER, ARISTEID ARISTEUS, CONTINENTAL SLOPE, CATALAN SEA
- 31 CARTES, J. E. (1998) - Dynamics of the bathyal Benthic Boundary Layer in the northwestern Mediterranean: depth and temporal variations in macrofaunal – megafaunal communities and their possible connections within deep-sea trophic webs  
Prog. Oceanogr. - 41: 111-139.  
Thème(s): DYNAMIC, BATHYAL, NORTHWESTERN MEDITERRANEAN, MACROFAUNAL, MEGAFUNAL COMMUNITIES,
- 32 CARTES, J. E. (1998) - Feeding strategies and partition of food sources in deep-water decapod crustaceans (400-2300m)  
J. Mar. Biol. Assoc. U. K. - 78: 509-524.  
Thème(s): FEEDING STRATEGIES, DEEP-WATER DECAPOD

- 33 CARTES, J. E. and F. SARDÀ (1993) - Zonation of the deep-sea decapod fauna in the Catalan Sea (Western Mediterranean).  
Mar. Ecol. Prog. Ser. - 51: 263-279.  
Thème(s): ZONATION, DEEP-SEA DECAPOD FAUNA, CATALAN SEA
- 34 CARTES, J. E. and M. CARRASSÓN (2004) - The influence of trophic variables in the depth-range distribution and zonation rates of deep-sea megafauna: the case of the Western Mediterranean assemblages.  
Deep-Sea Res. - 31: 355-361.  
Thème(s): TROPHIC VARIABLES, EPTH-RANGE DISTRIBUTION, ZONATION RATES, DEEP-SEA, MEGAFUNA, WESTERN MEDITERRANEAN
- 35 CARTES, J. E. and M. DEMESTRE (2003) - Estimating secondary production in the deep-water shrimp, *Aristeus antennatus* (Risso, 1816) in the Catalano-Balearic basin (Western Mediterranean).  
J. Northw. Atl. Fish. Sci. - 171: 233-246.  
Thème(s): SECONDARY PRODUCTION, DEEP-WATER, ARISTEUS ANTENNATUS, CATALANO-BALEARIC BASIN, WESTERN MEDITERRANEAN
- 36 CARTES, J. E. and F. MAYNOU (1998) - Food consumption by bathyal decapod crustacean assemblages in the western Mediterranean: predatory impact of megafauna and the food consumption-food supply balance in a deep-water food web.  
Mar. Ecol. Prog. Ser. - 26: 1305-1323.  
Thème(s): FOOD CONSUMPTION, BATHYAL DECAPOD CRUSTACEAN, WESTERN MEDITERRANEAN
- 37 CARTES, J. E. and F. SARDÀ (1992) - Abundance and diversity of decapod crustaceans in the deep-Catalan Sea (Western Mediterranean)  
J. Nat. Hist. - 94: 27-34.  
Thème(s): DIVERSITY OF DECAPOD CRUSTACEANS, DEEP-CATALAN SEA, WESTERN MEDITERRANEAN
- 38 CARTES, J. E. and J.-C. SORBE (1993) - Les communautés suprabenthiques bathyales de la mer Catalane (Méditerranée occidentale): données préliminaires sur la répartition bathymétrique et l'abondance des crustacés pécararides.  
Crustaceana - 64(2): 155-171.  
Thème(s): SUPRABENTHIQUES BATHYALE, MER CATALANE, REPARTITION BATHYMETRIQUE,
- 39 CARTES, J. E. and J.-C. SORBE (1995) - Deep-water Mysids of the Catalan sea: species composition, bathymetric and near bottom distribution.  
J. Mar. Biol. Assoc. U. K. - 75: 187-197.  
Thème(s): DEEP-WATER, MYSIDS, CATALAN SEA, COMPOSITION
- 40 CARTES, J. E. and J.-C. SORBE (1996) - Temporal population structure of deep-water cumaceans from the western Mediterranean slope (between 400 to 1300 m)  
Deep-sea Res - 43: 1423-1438.  
Thème(s): DEEP-WATER, CUMACEANS, WESTERN MEDITERRANEAN

- 41 CARTES, J. E. and J.-C. SORBE (1999) - Deep-water amphipods from the Catalan Sea slope (western Mediterranean): Bathymetric distribution, assemblage composition and biological characteristics.  
J. Nat. Hist.. - 33(8): 1133-1158.  
Thème(s): DEEP-WATER, AMPHIPODS,
- 42 CARTES, J. E., F. SARDÀ, J. B. COMPANY and J. LLEONART (1993) - Day-night migrations by deep-sea decapod crustaceans in experimental samplings in the Western Mediterranean sea.  
J. Exp. Mar. Biol. Ecol. - 171: 63-73.  
Thème(s): DAY-NIGHT MIGRATIONS, DEEP-SEA, DECAPOD CRUSTACEANS
- 43 CARTES, J. E., J. B. COMPANY and F. MAYNOU (1994) - Deep-water decapod crustacean communities in the Northwestern Mediterranean: influence of submarine canyons and season.  
Marine Biology - 120: 221-230.  
Thème(s): DEEP-WATER, DECAPOD CRUSTACEAN, NORTHWESTERN MEDITERRANEAN, SUBMARINE CANYONS
- 44 CARTES J. E., ELIZALDE M. and SORBE J (2001) - Contrasting lifehistories, secondary production, and trophic structure of Peracarid assemblages of the bathyal suprabenthos from the Bay of Biscay (NE Atlantic) and the Catalan Sea (NW Mediterranean).  
Deep-Sea Res. - 48: 2209-2232.  
Thème(s): LIFEHISTORIES, SECONDARY PRODUCTION, TROPHIC STRUCTURE, PERACARID ASSEMBLAGES, BATHYAL SUPRABENTHOS, BAY OF BISCAY, CATALAN SEA
- 45 CARTES, J. E., F. MAYNOU, B. MORALES-NIN, E. MASSUTÍ and J. MORANTA (2001) - Trophic structure of a bathyal benthopelagic boundary layer community south of the Balearic Islands (southwestern Mediterranean).  
Mar. Ecol. Prog. Ser. - 215: 23-35.  
Thème(s): TROPHIC STRUCTURE, BATHYAL BENTHOPELAGIC, BALEARIC ISLANDS
- 46 CARTES, J., A. GRÉMARE, F. MAYNOU, S. VILLORA-MORENO and A.DINET (2002) - Bathymetric changes in the distribution of particulate organic matter and associated fauna along a deep-sea transect down the Catalan sea slope (Northwestern Mediterranean).  
Prog. Oceanogr. - 53: 29-56.  
Thème(s): BATHYMETRIC CHANGE, ORGANIC MATTER, ASSOCIATED FAUNA, DEEP-SEA TRANSECT, CATALAN SEA
- 47 CARTES, J. E., D. JAUME and T. MADURELL, (2003) - Local changes in the composition and community structure of suprabenthic peracarid crustaceans on the bathyal Mediterranean: influence of environmental factors.  
Mar. Biol. - 143: 745-758.  
Thème(s): CHANGE, COMMUNITY STRUCTURE, SUPRABENTHIC PERACARID, CRUSTACEAN, BATHYAL MEDITERRANEAN, ENVIRONMENTAL FACTORS

- 48 CARTES, J. E., F. MAYNOU, J. MORANTA, E. MASSUTÍ, D. LLORIS and B. MORALES-NIN. (2004) - Changes in the patterns of bathymetric distribution among deep-sea fauna at local spatial scale: comparison of mainland vs. insular areas.  
Prog. Oceanogr. - 60: 29-45.  
Thème(s): BATHYMETRIC, DEEP-SEA FAUNA, INSULAR AREAS, MAINLAND
- 49 CHEN, M., XIAO, X., WANG, P., ZENG, X., WANG, F. (2005) - *Arthrobacter ardleyensis* sp. nov., isolated from Antarctic lake sediment and deep-sea sediment  
Arch Microbiol - 183: 301–305  
Thème(s): ANTARCTICA, ARTHROBACTER ARDLEYENSIS, CELL WALL, DEEP-SEA, DNA–DNA HYBRIDIZATION, MOL% G+C CONTENT
- 50 CHILDRESS, J. J. (1995) - Are there physiological and biochemical adaptations of metabolism in deep-sea animals?  
Trends Ecol. Evol. - 10(1): 30-36.  
Thème(s): PHYSIOLOGICAL, BIOCHEMICAL ADAPTATION, DEEP-SEA ANIMALS
- 51 COCITO, S., C. N. BIANCHI, C. MORRI and A. PEIRANO (2000) - First survey of sessile communities on subtidal rocks in an area with hydrothermal vents: Milos Island, Aegean Sea.  
Hydrobiol - 426: 113-121.  
Thème(s): SESSILE COMMUNITIE, SUBTIDAL ROCKS, HYDROTHERMAL VENTS, AEGEAN SEA
- 52 COLEMAN, D. and R. BALLARD (2001) - A highly concentrated region of cold hydrocarbon seeps in the southeastern Mediterranean Sea.  
Geo-Marine Letters - 21: 162-167.  
Thème(s): COLD HYDROCARBON SEEP, SOUTHEASTERN MEDITERRANEAN SEA
- 53 COLLINS, M. A., PRIEDE, I. G., ADDISON, S., SMITH, A. & P. M. BAGLEY (1998) - Acoustic tracking of the dispersal of organic matter by scavenging fishes in the deep-sea  
Hydrobiologia - 371/372: 181–186, 1998.  
Thème(s): DEEP SEA, CORYPHAENOIDES (NEMATONURUS) ARMATUS, TRANSPONDER, FOOD-FALL, BEHAVIOUR, TELEOST
- 54 COMPANY, J. B. and F. SARDÀ (2000) - Growth parameters of deep-water decapod crustaceans in the Northwestern Mediterranean Sea: a comparative approach  
Marine Biology - 136(1):79-90.  
Thème(s): GROWTH, DEEP-WATER, DECAPOD CRUSTACEANS, NORTHWESTERN MEDITERRANEAN SEA
- 55 COMPANY, J. B., F. SARDÀ and J. E. CARTES (2001) - Biological patterns and near-bottom population characteristics of two pasiphaeid decapod crustacean species, *Pasiphaea sivado* and *P. multidentata*, in the north-western Mediterranean Sea  
Marine Biology - 139(1): 61-73.  
Thème(s): BIOLOGICAL PATTERN, NEAR-BOTTOM POPULATION, DECAPOD CRUSTACEAN, NORTH-WESTERN MEDITERRANEAN SEA

- 56 COMPANY, J. B., G. ROTLLANT and F. SARDÀ (2003) - Gaps in Mediterranean deep-sea megafaunal assemblages.  
 CIESM Workshop Monograph, - 23: 31-34.  
Thème(s): MEDITERRANEAN, DEEP-SEA, MEGAFUNAL
- 57 CORBARI, L., MESMER-DUDONS, N., CARBONEL, P., MASSABUAU, J-C (2005) - Cytherella as a tool to reconstruct deep-sea paleo-oxygen levels: the respiratory physiology of the platycopid ostracod *Cytherella* cf. *abyssorum*  
 Marine Biology - 147: 1377–1386  
Thème(s): CYTHERELLA, DEEP-SEA PALEO-OXYGEN, RESPIRATORY PHYSIOLOGY, OSTRACOD CYTHERELLA
- 58 CORLISS, J. B., J. DYMOND, L. I. GORDON, J. M. EDMOND, R. P. VON HERZEN, R. D. BALLARD, K. GEEN, D. WILLIAMS, A. BAINBRIDGE, K. CRANE and T. H. VAN ANDEL, (1979) - Submarine thermal springs on the Galápagos Rift.  
 Science - 203: 1073-1083.  
Thème(s): THERMAL SPRING
- 59 CORSELLI, C. and D. BASSO, (1996) - First evidence of benthic communities based on chemosynthesis on the Napoli mud volcano (Eastern Mediterranean)  
 Mar. Geol. - 132: 227- 239.  
Thème(s): BENTHIC COMMUNITIE, CHEMOSYNTHESIS, NAPOLI MUD VOLCANO, EASTERN MEDITERRANEAN
- 60 COSSON, N., M. SIBUET and J. GALÉRON (1997) - Community structure and spatial heterogeneity of the deep-sea macrofauna at three contrasting stations in the tropical northeast Atlantic.  
 Deep-sea Res. - 44(2): 247-269.  
Thème(s): COMMUNITY STRUCTURE, DEEP-SEA, MACROFAUNA, TROPICAL NORTHEAST ATLANTIC
- 61 CRASSOUS, PH., A. KHRIPOUNOFF, J. LA ROSA and J.-C. MIQUEL (1991) - Remises en suspension sédimentaires observées en Méditerranée par 2000 m de profondeur à l'aide de pièges à particules.  
 Oceanol. Acta - 14(2) : 115-121  
Thème(s): SEDIMENT
- 62 D'ONGHIA, G., P. MAIORANO, A. MATARRESE and A. TURSI (1998) - Distribution, biology and population dynamics of *Aristaeomorpha foliacea* (Risso, 1827) (Decapoda, Natantia, Aristeidae) in the north-western Ionian Sea (Mediterranean Sea)  
 Crustaceana - 71 (5): 518-544.  
Thème(s): ARISTAEOMORPHA FOLIACEA, IONIAN SEA
- 63 D'ONGHIA, G., M. BASANISI, A. MATARRESE and F. MEGLI (1999) - Reproductive strategies in macrourid fish: Seasonality or not.  
 Mar. Ecol. Prog. Ser. - 184: 189-196.  
Thème(s): REPRODUCTIVE STRATEGIES, MACROURID FISH,

- 64 D'ONGHIA, G., CH.-Y. POLITOU, A. BOZZANO, D. LLORIS, G. ROTLLANT, L. SION and F. MASTROTOTARO. (2004) - Deep-water fish assemblages in the Mediterranean sea.  
 Sci. Mar. - 68 (suppl. 3):87-99.  
Thème(s): DEEP-WATER, FISH ASSEMBLAGE, MEDITERRANEAN SEA
- 65 DANOVARO, R., N. DELLA CROCE, A. ELEFThERIOU, M. FABIANO, N.PAPADOPOLOU, C. SMITH and A. TSELEPIDES (1995) - Meiofauna of the deep Eastern Mediterranean Sea: distribution and abundance in relation to bacterial biomass, organic matter composition and other environmental factors.  
 Prog. Oceanogr. - 36: 329-341.  
Thème(s): MEIOFAUNA, DEEP EASTERN MEDITERRANEAN SEA, BACTERIAL BIOMASS, ORGANIC MATTER, ENVIRONMENTAL FACTORS
- 66 DANOVARO, R., MARRALE, D., DELLA CROCE, N., DELL'ANNO, A., FABIANO, M., (1997) - Heterotrophic Nanoflagellates, Bacteria, and Labile Organic Compounds in Continental Shelf and Deep-Sea Sediments of the Eastern Mediterranean  
 MICROBIAL ECOLOGY - 35:244–255  
Thème(s): HETEROTROPHIC NANOFLAGELLATES, DEEP-SEA SEDIMENTS, EASTERN MEDITERRANEAN
- 67 DANOVARO, R., A. DINET, G. DUINEVELD and A. TSELEPIDES (1999) - Benthic response to particulate fluxes in different trophic environments: a comparison between the Gulf of Lions- Catalan Sea (Western Mediterranean) and the Cretan Sea (Eastern Mediterranean)  
 Prog. Oceanogr - 44: 287-312.  
Thème(s): TROPHIC CHAIN, CRETAN SEA, CATALAN SEA, GULF OF LION
- 68 DANOVARO, R., A. TSELEPIDES, A. OTEGUI and N. DELLA CROCE (2000) - Dynamics of meiofaunal assemblages on the continental shelf and deep-sea sediments of the Cretan Sea (NE Mediterranean): relationships with seasonal changes in food supply.  
 Prog. Oceanogr. - 46: 367-400.  
Thème(s): MEIOFAUNAL ASSEMBLAGE, DYNAMIC, CONTINENTAL SHELF, DEEP-SEA SEDIMENT, CRETAN SEA, SEASONAL CHANGE, FOOD SUPPLY
- 69 DANOVARO, R., A. DELL'ANNO, M. FABIANO, A. PUSCEDDU and A.TSELEPIDES, (2001) - Deep-sea ecosystem response to climate changes: the Eastern Mediterranean case study.  
 Trends Ecol. Evol. - 16(9): 505-510.  
Thème(s): DEEP-SEA, ECOSYSTEM RESPONSE, CLIMATE CHANGE, EASTERN MEDITERRANEAN
- 70 DE BOVÉE, F., L. D. GUIDI and J. SOYER (1990) - Quantitative distribution of deep-sea meiobenthos in the northwestern Mediterranean (Gulf of Lions).  
 Cont. Shelf Res. - 10(9-11): 1123-1145.  
Thème(s): MEIOBENTHOS, NORTHWESTERN MEDITERRANEAN, GULF OF LIONS

- 71 DE LANGE, G. J., J. J. MIDDELBURG, C. H. VAN DER WEIJDEN, G. (1990) - Composition of anoxic hypersaline brines in the Tyro and Bannock basins, Eastern Mediterranean.  
Mar. Chem. - 31: 63-88.  
Thème(s): ANOXIC HYPERSALINE BRINES, BANNOCK BASINS, EASTERN MEDITERRANEAN
- 72 DELIBRIAS, G. and M. TAVIANI, (1984) - Dating the death of Mediterranean deep-sea scleractinian corals.  
Mar. Geol. - 31: 63-88.  
Thème(s): MEDITERRANEAN, SCLERACTINIAN CORALS
- 73 DELLA TOMMASA, L., BELMONTE, G., PALANQUES, A., PUIG, P., & F., BOERO (2000) - Resting stages in a submarine canyon: a component of shallow–deep-sea coupling?  
Hydrobiologia - 440: 249–260, 2000.  
Thème(s): SUBMARINE CANYON, RESTING STAGES, SHALLOW–DEEP-SEA COUPLING, LIFE CYCLE
- 74 DEMESTRE, M. and J. LLEONART, (1993) - Population dynamics of *Aristeus antennatus* (Decapoda: Dendrobranchiata) in the northwestern Mediterranean.  
Sci. Mar. - 57(2-3): 183-189.  
Thème(s): POPULATION DYNAMIC, ARISTEUS ANTENNATUS,
- 75 DEMESTRE, M. and P. MARTÍN, (1993) - Optimum exploitation of a demersal resource in the western Mediterranean: the fishery of the deep-water shrimp *Aristeus antennatus* (Risso, 1816)  
Sci. Mar. - 57(2-3): 175-182.  
Thème(s): DEEP-WATER, SHRIMP, ARISTEUS ANTENNATUS
- 76 DESBRUYÈRES, D. (2003) - Chemosynthesis-based ecosystems in the deep Atlantic – what we do know and we don't.  
CIESM Workshop Monograph - 23: 73-76.  
Thème(s): ATLANTIC, ECOSYSTEMS
- 77 DIXON, J. L. and TURLEY, C. M. (2001) - Measuring Bacterial Production in Deep-Sea Sediments using <sup>3</sup>H-Thymidine Incorporation: Ecological Significance  
MICROBIAL ECOLOGY - 42:549–561  
Thème(s): BACTERIAL PRODUCTION, DEEP-SEA SEDIMENTS, DEEP SEA
- 78 DURRIEU DE MADRÓN, X., P. CASTAING, F. NYFFELER and T. COURP (1999) - Slope transport of suspended particulate matter on the Aquitanian margin of the Bay of Biscay  
Deep-Sea Res - part II, 46: 2003-2027.  
Thème(s): BAY OF BISCAY, SUSPENDED PARTICULATE
- 79 ELLINGSEN, K.E., BRANDT, A., EBBE, B. (2007) - Diversity and species distribution of polychaetes, isopods and bivalves in the Atlantic sector of the deep Southern Ocean  
Polar Biol - 30:1265-1273  
Thème(s): BENTHIC DATA, DEEP-SEA, DIVERSITY, DEEP SOUTHERN OCEAN

- 80 ESTEBAN, G. F., GOODAY, A. J., CLARKE, K. J., (2007) - Siliceous scales of Wlose-amoebae (Pompholyxophryidae, Rotosphaerida) from deep Southern Ocean sediments, including Wrst records for the Southern Hemisphere  
Polar Biol - 30:945–950  
Thème(s): ANTARCTICA, BIOGEOGRAPHY, HELIOZOA, SCALE-BEARING PROTISTS, SOUTH SANDWICH ISLANDS, SOUTHERN HEMISPHERE
- 81 RODRIGUEZ, E., & LOPEZ-GONZALEZ (2005) - New record of the sea anemone *Kadosactis antarctica* (Carlgren, 1928): re-description of an Antarctic deep-sea sea anemone, and a discussion of its generic and familial placement  
Helgol Mar Res - 59: 301–309  
Thème(s): KADOSACTIS, KADOSACTIDAE, SAGARTIOGETON, ACTINIARIA, DEEP-SEA, SOUTH SHETLAND ISLANDS
- 82 FANELLI, E. and J. E. CARTES (2004) - Feeding habits of Pandalid shrimps in the Alboran Sea (SW Mediterranean): Influence of biological and environmental variables.  
Mar. Ecol. Prog. Ser. - 280: 227-238.  
Thème(s): FEEDING HABITS, SHRIMP
- 83 FERNEX, F.E., MIGON, C., & J. R. M. CHISHOLM (2001) - Entrapment of pollutants in Mediterranean sediments and biogeochemical indicators of their impact  
Hydrobiologia - 50: 31–46, 2001.  
Thème(s): CONTAMINATION, DETRITAL TRANSFER TO THE DEEP-SEA, DIAGENETIC PROCESSES, SEDIMENT QUALITY
- 84 FIALA-MÉDIONI, A., (2003) - Sources of energy for deep-sea benthos in Mediterranean mud volcanoes.  
CIESM Workshop Monograph - 23: 77-80.  
Thème(s): MEDITERRANEAN DEEP SEA BENTHOS, VOLCANO
- 85 FIEGE, D., KRÖNCKE, I. & R., BARNICH (2000) - High abundance of *Myriochele fragilis* Nilsen & Holthe, 1985 (Polychaeta: Oweniidae) in the deep sea of the Eastern Mediterranean  
Hydrobiologia - 426: 97–103, 2000.  
Thème(s): EASTERN MEDITERRANEAN SEA, DEEP SEA, OWENIIDAE, MYRIOCHELE FRAGILIS, HIGH ABUNDANCE
- 86 FIORENTINO F., L. ORSI RELINI, A. ZAMBONI and G. RELINI (1998) - Remarks about the optimal harvest strategy for red shrimps (*Aristeus antennatus*, Risso 1816) on the basis of the Ligurian experience.  
Cahiers Options méditerranéennes - 35: 323-333  
Thème(s): RED SHRIMPS, ARISTEUS ANTENNATUS
- 87 FISHELSON, L. and B. S. GALIL, (2001) - Gonad structure and reproductive cycle in the deep sea hermaphrodite tripodfish, *Bathypterois mediterraneus* (Chlorophthalmidae, Teleostei).  
Copeia - 2): 556-560.  
Thème(s): GONAD STRUCTURE, REPRODUCTIVE CYCLE, HERMAPHRODITE TRIPODFISH, DEEP SEA

- 88 FLACH, E. and C. HEIP (1996) - Vertical distribution of macrozoobenthos within the sediment on the continental slope of the Goban Spur area (NE Atlantic).  
Mar. Ecol. Prog. Ser. - 141: 55-66.  
Thème(s): VERTICAL DISTRIBUTION, MACROZOOBENTHOS, SEDIMENT, GOBAN SPUR AREA
- 89 FONT, J., J. SALAT and J. TINTORÉ, (1988) - Permanent features of the circulation in the Catalan Sea  
Oceanol. Acta - 9: 51- 57.  
Thème(s): CATALAN SEA, CIRCULATION
- 90 FREDJ, G. and L. LAUBIER (1985) - The deep Mediterranean benthos. In: Mediterranean marine ecosystems. M. Moraitou- Apostolopoulou and V. Kiortsis (eds.). Plenum Press, New York. - pp. 109-146.  
Thème(s): DEEP MEDITERRANEAN BENTHOS
- 91 FREDJ G, D. BELLAN-SANTINI and M. MEINARDI, (1992) - État des connaissances sur la faune marine méditerranéenne.  
Bull. Inst. Ocean. Monaco, - n° spécial 9, pp. 133-145.  
Thème(s): MEDITERRANEENNE, FAUEN MARINE
- 92 GAD, G., (2003) - A new genus of Nanaloricidae (Loricifera) from deep-sea sediments of volcanic origin in the Kilinailau Trench north of Papua New Guinea  
Helgol Mar Res - 58:40–53  
Thème(s): MEIOFAUNA, LORICIFERA, DEEP SEA, ZOOGEOGRAPHY, EXPEDITION SO-133 EDISON II
- 93 GAGE, J. D. and P. A. TYLER (1991) - Deep-sea Biology: a natural history of organisms at the deep-sea floor.  
Cambridge University Press, Cambridge. - 504 pp.  
Thème(s): DEEP-SEA, BIOLOGY, MEDITERRANEAN
- 94 GALIL, B. S. and P. F. CLARK (1993) - A new genus and species of axiid (Decapoda, Thalassinidea) from the Levantine basin of the Mediterranean.  
Crustaceana - 64(1): 45-55.  
Thème(s): MEDITERRANEAN, NEW GENUS, DECAPODA, EVANTINE BASIN, MEDITERRANEAN
- 95 GALIL, B. S. and M. GOREN (1994) - The deep sea Levantine fauna – new records and rare occurrences.  
Senckenbergiana Marit. - 25(1/3): 41-52.  
Thème(s): LEVANTINE SEA, DEEP SEA FAUNA
- 96 GALIL, B. S. and H. ZIBROWIUS (1998) - First benthos samples from Eratosthenes seamount, Eastern Mediterranean.  
Senckenbergiana Marit - 28(4/6): 111-121.  
Thème(s): BENTHOS, ERATOSTHENES SEAMOUNT, EASTERN MEDITERRANEAN

- 97 GALIL, B. S., A. GOLIK and M. TÜRKAY (1995) - Litter at the bottom of the sea: A sea bed survey in the eastern Mediterranean.  
Mar. Pollut. Bull. - 30(1): 22-24.  
Thème(s): EASTERN MEDITERRANEAN, LITTER,
- 98 GEBCO C.E. (2003) - General Bathymetric Chart of the Ocean.  
British Oceanographic Data Center. -  
Thème(s): BATHYMETRY MAPPING
- 99 GILI, J.-M., J. BOUILLON, F. PAGÈS, A. PALANQUES, P. PUIG, and S. HEUSSNER, (1998) - Origin and biogeography of the deep-water Mediterranean Hydromedusae including the description of two new species collected in submarine canyons of NorthWestern Mediterranean Sci. Mar. - 62: 113-134  
Thème(s): BIOGEOGRAPHY, DEEP-WATER, HYDROMEDUSAE, NEW SPECIES, NORTHWESTERN MEDITERRANEAN
- 100 GILI, J.-M, F. PAGÈS, J. BOUILLON, A. PALANQUES, P. PUIG, S. HEUSSNER, A. CALAFAT, M. CANALS, A. MONACO, (2000) - A multidisciplinary approach to the understanding of hydromedusan populations inhabiting Mediterranean submarine canyons.  
Deep-Sea Res. - 47(8): 1513-1533.  
Thème(s): HYDROMEDUSAN POPULATIONS, MEDITERRANEAN, SUBMARINE CANYONS
- 101 GIULIANO, L., C. TAMBURINI, A. TURSI and C. CORSELLI, (2003) - Deep-sea bacteria: The Mediterranean sea as a model environment.  
CIESM Workshop Monograph - 23: 61-66.  
Thème(s): MICROBIOLOGY
- 102 GOFFREDI, S.K., HURTADO, L.A., HALLAM, S., VRIJENHOEK, R.C. (2003) - Evolutionary relationships of deep-sea vent and cold seep clams (Mollusca: Vesicomidae) of the “pacifica/lepta ” species complex  
Marine Biology - 142: 311–320  
Thème(s): COLD SEEP CLAMS, DEEP-SEA, MOLLUSCA, VESICOMYIDAE
- 103 GOODAY, A. J., L. A. LEVIN, P. LINKE and T. HEEGER (1992) - The role of benthic foraminifera in deep-sea food webs and carbon cycling. In: Deep-Sea food chains and the global carbon cycling.  
G . T. Rowe and V. Pariente (eds.). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. pp. - pp. 63-92.  
Thème(s): BENTHIC FORAMINIFERA, DEEP-SEA, FOOD WEB, CARBON CYCLING, FOOD CHAIN
- 104 GORDON, J. D. M. and J. A. R. DUNCAN (1985) - The biology of fish of the Family Moridae in the deep-water Rockall Trough.  
Mar. Biol. Assoc. U. K. - 65: 475-485.  
Thème(s): BIOLOGY, FISH, DEEP-WATER
- 105 GRASSLE, J. F. (1977) - Slow recolonization of deep-sea sediment.  
Nature - 265: 618-619.  
Thème(s): RECOLONIZATION, DEEP-SEA, SEDIMENT

- 106 GRASSLE, J. F. (1991) - Deep-sea benthic biodiversity.  
Bio- Science, - 41(7): 464-469.  
Thème(s): DEEP-SEA, BENTHIC, BIODIVERSITY
- 107 GUBBAY, S. (2003) - Seamounts of the North-East Atlantic.  
Project OASIS. World Wildlife Fund, Frankfurt. - 38 pp.  
Thème(s): SEAMOUNTS, NORTH-EAST ATLANTIC
- 108 HAEDRICH, R. L. (1996) - Deep-water fishes: evolution and adaptation in the earth's largest living spaces.  
J. Fish Biol. - 49(suppl. A): 40-53.  
Thème(s): DEEP-WATER, FISH, EVOLUTION, ADAPTATION
- 109 HAEDRICH, R. L. and N. R. MERRETT (1988) - Summary atlas of deep-living demersal fishes in the North Atlantic Basin.  
J.Nat. Hist. - 22: 1325-1362.  
Thème(s): DEEP-LIVING, DEMERSAL, FISHES, NORTH ATLANTIC BASIN
- 110 HAEDRICH, R. L., G. T. ROWE and P. T. POLLONI (1975) - Zonation of faunal composition of epibenthic population on the continental slope south of New England.  
J. Mar. Res. - 33: 191-212.  
Thème(s): EPIBENTHIC, CONTINENTAL SLOPE, NEW ENGLAND
- 111 HAEDRICH, R. L., G. T. ROWE and P. T. POLLONI (1980) - The megabenthic fauna in the deep sea south of New England, USA.  
Mar. Biol. - 57: 165-179.  
Thème(s): MEGABENTHIC FAUNA, DEEP SEA, SOUTH OF NEW ENGLAND
- 112 HECKER, B (1990) - Variation in megafaunal assemblages on the continental margin south of New England.  
Deep-Sea Res - 37(1): 35-57.  
Thème(s): MEGAFANAUNAL ASSEMBLAGE, CONTINENTAL MARGIN, NEW ENGLAND
- 113 HECKER, B (1990) - Photographic evidence for the rapid flux of particles to the sea floor and their transport down the continental slope.  
Deep-Sea Res. - 37: 1773-1782.  
Thème(s): SEA FLOOR,
- 114 HEIJS, S.K., ALOISI, G., BOULOUBASSI, I., PANCOST, R.D., PIERRE, C., SINNINGHE DAMSTE, J.S., GOTTSCHAL, J.C., VAN ELSAS, J.D. AND L.J. FORNEY (2006) - Microbial Community Structure in Three Deep-Sea Carbonate Crusts  
MICROBIAL ECOLOGY - 52, 451-462  
Thème(s): S RRNA, MICROBIAL COMMUNITY STRUCTURE AND FUNCTION, DEEP-SEA

- 115 HEIJS,S.K., HAESE, R.R., VAN DER WIELEN, P. W. J. J., FORNEY L. J., AND J-D VAN ELSAS1 (2007) - Use of 16S rRNA Gene Based Clone Libraries to Assess Microbial Communities Potentially Involved in Anaerobic Methane Oxidation in a Mediterranean Cold Seep  
MICROBIAL ECOLOGY - 49, 367–378  
Thème(s): S RRNA, MICROBIAL COMMUNITY STRUCTURE AND FUNCTION, DEEP-SEA
- 116 HEIKOOP, J.M., HICKMOTT, D.D., RISK, M.J., SHEARER, C.K.& V. ATUDOREI (2002) - Potential climate signals from the deep-sea gorgonian coral *Primnoa resedaeformis*  
Hydrobiologia - 471: 117–124, 2002  
Thème(s): DEEP-WATER CORALS, 14C,  $\delta$  [13] C and  $\delta$  [15] N, SIMS, CLIMATE RECORD, PRODUCTIVITY
- 117 HENRY, P., X. LE PICHON, S. LALLEMANT, S. LANCE, J. MARTIN, J. P. FOUCHER, A. FIALA-MÉDIONI, N. GUILHAUMOU, F. ROSTEK, V.PRANAL and M. CASTREC (1996) - Fluid flow in and around a mud volcano field seaward of the Barbados Accretionary Wedge: results from Manon Cruise.  
J. Geophys. Res. - 101(B9): 20297-20323.  
Thème(s): FLUID FLOW, MUD VOLCANO
- 118 HERRING, P. J., WIDDER, E. A. (2004) - Bioluminescence of deep-sea coronate medusae (Cnidaria: Scyphozoa)  
Marine Biology - 146: 39–51  
Thème(s): BIOLUMINESCENCE, DEEP-SEA, MEDUSAE, DEEP-SEA
- 119 HOPKINS, T. S (1985) - Physics of the sea. In: Key Environments: Western Mediterranean.  
R. Margalef (ed.). Pergamon Press, New York. - pp. 100-125.  
Thème(s): WESTERN MEDITERRANEAN, GEOLOGY
- 120 HOPPER, A. G (1995) - Deep water fisheries of the North Atlantic Ocean.  
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. -  
Thème(s): DEEP WATER, FISHERIES, NORTH ATLANTIC OCEAN
- 121 INAGAKI,F., TAKAI, K., KOMATSU, T., KANAMATSU, T., FUJIOKA, K., K., HORIKOSHI (2001) - Archaeology of Archaea: geomicrobiological record of Pleistocene thermal events concealed in a deep-sea seafloor environment  
Extremophiles - 5:385–392  
Thème(s): SUBSEAFLOOR ENVIRONMENT, PLEISTOCENE ARCHAEA, 16S RDNA, T-RFLP, DGGE
- 122 INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE EXPLORATION OF THE SEA, (2003) - Is time running out for deepsea fish?  
<http://www.ices.dk/>  
Thème(s): DEEP SEA, FISH

- 123 INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION (2001) - Standardization of undersea feature names.  
Bathymetric Publication - 6, 3rd Edition.  
Thème(s): BATHYMETRY, MAPPING
- 124 ISLA, E., GERDES, D., PALANQUES, A., TEIXIDO, N., ARNTZ, W., PUIG, P., (2006) - Relationships between Antarctic coastal and deep-sea particle fluxes: implications for the deep-sea benthos  
Polar Biol - 29: 249–256  
Thème(s): ANTARCTIC COASTAL, DEEP-SEA, PARTICLE FLUXES, BENTHOS
- 125 JOHNSON, J.E. and R.T. HILL (2003) - Sediment Microbes of Deep-Sea Bioherms on the Northwest Shelf of Australia  
MICROBIAL ECOLOGY - 46:55–61  
Thème(s): SEDIMENT MICROBES, DEEP-SEA, NORTHWEST SHELF OF AUSTRALIA
- 126 KALLIANOTIS A., K. SOPHRONODIS, P. VIDORIS and A. TSELEPIDES (2000) - Demersal fish and megafaunal assemblages on the Cretan continental shelf and slope (NE Mediterranean): seasonal variation in species density, biomass and diversity.  
Prog. Oceanogr. - 46: 429-455.  
Thème(s): DEMERSAL FISH, MEGAFAUNAL ASSEMBLAGE, CRETAN CONTINENTAL SHELF, NE MEDITERRANEAN
- 127 KENNICUTT, M.C., J. M. BROOKS, R. R. BIDIGARE, R. R. FAY, T. L. WADE and T. J. MCDONALD (1985) - Vent-type taxa in a hydrocarbon seep region on the Louisiana slope.  
Nature - 317: 351-353.  
Thème(s): HYDROCARBON SEEP, LOUISIANA SLOPE
- 128 KLAUSEWITZ, W (1989) - Deep sea and deep water fish of the Eastern Mediterranean, collected during the Meteor Expedition  
Senckenbergiana Marit. - 20: 251-263.  
Thème(s): DEEP SEA, FISH, EASTERN MEDITERRANEAN
- 129 KOBAYASHI, H., NOGI, Y., HORIKOSHI, K. (2007) - New violet 3,3'-bipyridyl pigment purified from deep-sea microorganism *Shewanella violacea* DSS12  
Extremophiles - 11:245–250  
Thème(s): SHEWANELLA VIOLACEA, INDIGOIDINE, DEEP-SEA, VIOLET PIGMENT, CRYSTAL STRUCTURE
- 130 KOSLOW, J. A. (1997) - Seamounts and the ecology of deep-sea fisheries.  
Am. Scient. - 85: 168-176  
Thème(s): SEAMOUNT, ECOLOGY, DEEP-SEA, FISHERIES
- 131 KOSLOW, J. A., G. W. BOEHLERT, J. D. M. GORDON, R. L. HAEDRICH, P. LORANCE and N. PARIN (2000) - Continental slope and deepsea fisheries: implications for a fragile ecosystem.  
ICES J. Mar. Sci. - 57: 548-557.  
Thème(s): CONTINENTAL SLOPE, DEEPSEA FISHERIES,

- 132 KOYAMA, S., HORII, M., MIWA, T., AIZAWA, M. (2003) - Tissue culture of the deep-sea eel *Simenchelys parasiticus* collected at 1,162 m  
*Extremophiles* - 7(3):245-8  
Thème(s): DEEP-SEA, SIMENCHELYS PARASITICUS
- 133 KRESS, N., A. GOLIK, B. S. GALIL and M. D. KROM (1993) - Monitoring the disposal of coal fly ash at a deep water site in the eastern Mediterranean Sea.  
*Mar. Pollut. Bull.*, - 26(8): 447-456.  
Thème(s): MONITORING, COAL FLY, DEEP WATER, EASTERN MEDITERRANEAN SEA
- 134 LABROPOULOU, M., & C. PAPACONSTANTINO (2000) - Community structure of deep-sea demersal fish in the North Aegean Sea (northeastern Mediterranean)  
*Hydrobiologia* - 40: 281–296, 2000.  
Thème(s): DEMERSAL FISH, DEPTH ZONATION, SPECIES DIVERSITY, HABITAT WIDTH, EASTERN MEDITERRANEAN
- 135 LACK, M., K. SHORT and A. WILLOCK (2003) - Managing risk and uncertainty in deep-sea fisheries: lessons from Orange Roughy  
*Traffic Oceania and World Wildlife Fund*, - 73 pp.  
Thème(s): ORANGE ROUGHY, DEEP-SEA FISHERIES
- 136 LAMPADARIOU, N., E. HATZIYANNI and A. TSELEPIDES (2003) - Community structure of meiofauna and macrofauna in Mediterranean Deep-Hyper-saline Anoxic Basins.  
*CIESM Workshop Monograph* - 23: p. 55-60.  
Thème(s): MEIOFAUNA, MACROFAUNA, MEDITERRANEAN, DEEP-HYPER-SALINE ANOXIC BASINS?
- 137 LAMPITT, R. S., D. S. M. BILLET and A. L. RICE (1986) - Biomass of the invertebrate megabenthos from 500 to 4100 m in the northeast Atlantic Ocean.  
*Mar. Biol.* - 93: 69-81.  
Thème(s): BIOMASS, INVERTEBRATE MEGABENTHOS, NORTHEAST ATLANTIC OCEAN
- 138 LAURO, F., M., BARTLETT, D.H., (2007) - Prokaryotic lifestyles in deep sea habitats  
*Extremophiles* -  
Thème(s): PSYCHROPHILES, ECOLOGY, COMPARATIVE GENOMICS, PIEZOPHYSIOLOGY, PIEZOPHILES, HIGH PRESSURE, BIOSCIENCES, BIODIVERSITY, GENOMICS
- 139 LAURO, F.M., BERTOLONI, G., OBRAZTSOVA, A., KATO, C., TEBO, B.M., BARTLETT, D.H., (2004) - Pressure effects on *Clostridium* strains isolated from a cold deep-sea environment  
*Extremophiles* - 8:169–173  
Thème(s): CLOSTRIDIUM, CLOSTRIDIUM BIFERMENTANS, DEEP SEA, JAPAN TRENCH, PRESSURE
- 140 LI, L., KATO, C., and K., HORIKOSHI (1999) - Bacterial diversity in deep-sea sediments from different depths  
*Biodiversity and Conservation* - 8: 659 - 677, 1999.  
Thème(s): BACTERIAL DIVERSITY, BAROPHILIC BACTERIA, DEEP-SEA, PSEUDOMONAS SP, UNCULTURABLE BACTERIA

- 141 LOPEZ-GONZALEZ, P.J., (2006) - A new gorgonian genus from deep-sea Antarctic waters (Octocorallia, Alcyonacea, Plexauridae)  
Helgol Mar Res - 60: 1–6  
Thème(s): CNIDARIA, OCTOCORALLIA, ALCYONACEA, PLEXAURIDAE, ANTARCTICA, MESOGLIGORGIA
- 142 LOUBRIEU B. and SATRA C (2001) - Cartographie par sondeur multifaisceaux de la Ride Méditerranéenne et des domaines voisins  
Comité Français de Cartographie, - n 168, pp. 15-21.  
Thème(s): CARTOGRAPHIE, SONDEUR MULTIFAISCEAUX, RIDE MEDITERRANEENNE
- 143 LOUBRIEU, B., C. SATRA and R. CAGNA (2000) - Cartography by multibeam echosounder of Mediterranean Ridge and surrounding areas.  
IFREMER/CIESM. Ed. IFREMER, - Maps & Atlases, 2 map.  
Thème(s): CARTOGRAPHY, MULTIBEAM ECHOSOUNDER, MEDITERRANEAN RIDGE
- 144 LUTZ, R. A. and R. M. HAYMON (1994) - Rebirth of a deep-sea vent.  
Nat. Geogr. Mag. - 186(5): 115-126.  
Thème(s): SEA VENTS
- 145 MACPHERSON, E (1979) - Ecological overlap between Macrourids in the western Mediterranean Sea.  
Marine Biology - 53: 149-159  
Thème(s): ECOLOGICAL OVERLAP, WESTERN MEDITERRANEAN SEA
- 146 MACQUART-MOULIN, C. and G. PATRITI (1996) - Accumulation of migratory micronekton crustaceans over the upper slope and submarine canyons of the North-western Mediterranean.  
Deep-Sea Res - 43: 579-601.  
Thème(s): CRUSTACEANS, SUBMARINE CANYON, NORTH-WESTERN MEDITERRANEAN
- 147 MADURELL, T. and J. E. CARTES (2003) - Suprabenthic peracarid fauna collected at bathyal depths of the Ionian Sea (Eastern Mediterranean)  
Crustaceana - 76(5): 611-624.  
Thème(s): SUPRABENTHIC, PERACARID FAUNA, BATHYAL DEPTHS, IONIAN SEA, EASTERN MEDITERRANEAN
- 148 MADURELL, T. and CARTES, J. E. (2005) - Temporal changes in feeding habits and daily rations of *Hoplostethus mediterraneus* in the bathyal Ionian Sea (eastern Mediterranean)  
Marine Biology - 146: 951–962  
Thème(s): HOPLOSTETHUS MEDITERRANEUS, DEMERSAL FISH, FEEDING HABITS, BATHYAL IONIAN SEA, EASTERN MEDITERRANEAN
- 149 MADURELL, T. and CARTES, J. E. (2006) - Trophic relationships and food consumption of slope dwelling macrourids from the bathyal Ionian Sea (eastern Mediterranean)  
Marine Biology - 148: 1325–1338  
Thème(s): TROPHIC RELATIONSHIPS, MACROURIDS, BATHYAL IONIAN SEA, EASTERN MEDITERRANEAN

- 150 MADURELL, T., J. E. CARTES and M. LABROPOULOU (2004) - Spatiotemporal changes in the bathyal-fish assemblages of the Ionian Sea (Eastern Mediterranean)  
Fish. Res. - 66: 245-260.  
Thème(s): BATHYAL SPECIES, IONIAN SEA, EASTERN MEDITERRANEAN
- 151 MANNING, R. B. and L. B. HOLTHUIS (1989) - Two new genera and nine new species of Geryonid crabs (Crustacea, Decapoda, Geryonidae)  
Proc. Biol. Soc. Washington, - 102(1):50-77  
Thème(s): NEW GENERA, GERYONID CRABS, CRUSTACEA, DECAPODA
- 152 MASSUTI, E., B. MORALES-NIN and C. STEFANESCU (1995) - Distribution of five grenadier fish (Pisces: Macrouridae) from the upper and middle slope of the northwestern Mediterranean.  
Deep-Sea Res. - 42(3): 307-330.  
Thème(s): GRENADIER FISH, NORTHWESTERN MEDITERRANEAN
- 153 MASTROTOTARO, F., A. MATARRESE and A. TURSI, (2002) - Un mare di coralli nel mar Ionio  
Biol. Mar. Medit. - 9(1): 616-619.  
Thème(s): IONIAN SEA, CORAL
- 154 MATARRESE, A., G. D'ONGHIA, A. TURSI and P. MAIORANO (1997) - Vulnerabilità e resilienza di *Aristaeomorpha foliacea* (Risso, 1827) e *Aristeus antennatus* (Risso, 1816) (Crustacei, Decapodi) nel Mar Ionio.  
S.It.E. Atti, - 18: 535-538.  
Thème(s): IONIAN SEA, ARISTAEOMORPHA FOLIACEA, ARISTEUS ANTENNATUS
- 155 MATSUURA, H. and S. NISHIDA, (2000) - Fine structure of the "button setae" in the deep-sea pelagic copepods of the genus *Euaugaptilus* (Calanoida : Augaptilidae)  
Marine Biology - 137: 339-345  
Thème(s): DEEP-SEA PELAGIC, COPEPODS,
- 156 MAYNOU, F. and J. E. CARTES, (1998) - Daily ration estimates and comparative study of food consumption in nine species of deep-water decapod crustaceans of the NW Mediterranean.  
Mar. Ecol. Prog. Ser. - 171: 221-231.  
Thème(s): DEEP-WATER, DECAPOD CRUSTACEANS, NW MEDITERRANEAN
- 157 MAYNOU, F. and J. E. CARTES, (2000) - Community structure of bathyal decapod crustaceans off south-west Balearic Islands (western Mediterranean): seasonality and regional patterns in zonation.  
J. Mar. Biol. Assoc. U.K. - 80: 789-798  
Thème(s): COMMUNITY STRUCTURE, BATHYAL DECAPOD CRUSTACEAN, BALEARIC ISLAND, WESTERN MEDITERRANEAN,
- 158 MEDERNACH, L (2000) - Relations entre la matière organique et la faune benthique dans le golfe du Lion. Association de plusieurs approches à différentes échelles de temps et d'espace.  
Thèse Doctorat Université Pierre et Marie Curie - 386 pp.  
Thème(s): MATIERE ORGANIQUE, FAUNE BENTHIQUE, GOLFE DU LION

- 159 MEDINAUT/MEDINETH SHIPBOARD SCIENTIFIC PARTIES (2000) - Linking Mediterranean brine pools and mud volcanism.  
EOS Trans., Am. Geophys. Union, - 81: 631-633.  
Thème(s): BRINE POOLS, MUD, VOLCANO
- 160 MERRETT, N. R. and R. L. HAEDRICH, (1997) - Deep-Sea demersal fish and fisheries.  
Chapman and Hall, London. - 282 pp.  
Thème(s): DEEP-SEA, DEMERSAL FISH, FISHERIES
- 161 MILLER, A. R., P. TCHERNIA, H. CHARNON and D. A. MCGILL (1970) - Mediterranean sea atlas of Temperature, Salinity, Oxygen. Profiles and data from cruises of RV Atlantis and RV Chain.  
The Woods Hole Oceanographic Institution,  
Woods Hole, Mass. - Vol. III.  
Thème(s): MEDITERRANEAN SEA, TEMPERATURE, SALINITY, OXYGEN
- 162 MIQUEL, J.-C., S.W. FOWLER, J. LA ROSA, P. BUAT-MENARD (1994) - Dynamics of the downward flux of particles and carbon in the open North Western Mediterranean Sea.  
Deep-Sea Res. - 41: 243-261.  
Thème(s): DYNAMICS, WESTERN MEDITERRANEAN SEA
- 163 MARGARITA, L., MIROSHNICHENK, O., ELIZAVETA, A., BONCH-OSMOLOVSKAYA (2006) - Recent developments in the thermophilic microbiology of deep-sea hydrothermal vents  
Extremophiles - 10:85-96  
Thème(s): DEEP-SEA HYDROTHERMAL VENTS, THERMOPHILIC PROKARYOTES, BIODIVERSITY
- 164 MIURA, T., ABE, F., INOUE, A., USAMI, R. & K. HORIKOSHI (2001) - Purification and characterization of novel extracellular endopolygalacturonases from a deep-sea yeast, *Cryptococcus* sp. N6, isolated from the Japan Trench  
Biotechnology Letters - 23: 1735-1739, 2001.  
Thème(s): COPPER-TOLERANT YEAST, DEEP-SEA YEAST, ENDOPOLY GALACTURONASE, GLYCOPROTEIN, CRYPTOCOCCUS
- 165 MONACO, A., X. DURRIEU DE MADRÓN, O. RADA KOVITCH, S. HEUSSNER and J. CARBONNE (1999) - Origin and variability of downward biogeochemical fluxes on the Rhone continental margin (NW Mediterranean).  
Deep-Sea Res - 46(9): 1483-1511.  
Thème(s): BIOGEOCHEMICAL, CONTINENTAL MARGIN, NW MEDITERRANEAN
- 166 MONNIOT, C. and F. MONNIOT (1990) - Revision of the class Sorberacea (benthic tunicates) with descriptions of seven new species.  
Zool. J. Linn. Soc. - 99: 239-290.  
Thème(s): BENTHIC TUNICATES, NEW SPECIES

- 167 MORALES-NIN, B., F. MAYNOU, F. SARDÀ, J. E. CARTES, J. MORANTA, E. MASSUTÍ, J. COMPANY, G. ROTLLANT, A. BOZZANO and C. STEFANESCU, (2003) - Size influence in zonation patterns in fishes and crustaceans from deep-water communities of the Western Mediterranean.  
J. Northw. Atl. Fish. Sci. - 31:413-430.  
Thème(s): FISHES, CRUSTACEANS, DEEP-WATER, WESTERN MEDITERRANEAN
- 168 MORANTA, J., C. STEFANESCU, E. MASSUTÍ, B. MORALES-NIN and D. LLORIS, (1998) - Fish community structure and depth-related trends on the continental slope of the Balearic Islands (Algerian Basin, Western Mediterranean)  
Mar. Ecol. Prog. Ser. - 31:413-430.  
Thème(s): FISH, CONTINENTAL SLOPE, BALEARIC ISLANDS, ALGERIAN BASIN, WESTERN MEDITERRANEAN
- 169 MORANTA, J., J. D. M., GORDON, E. MASSUTÍ, S. C. SWAN, C. STEFANESCU, B. MORALES-NIN and N. R. MERRETT (2003) - Differences in biomass composition and size-related structure between Mediterranean and Atlantic deep-sea assemblages  
CIESM Workshop Monograph - 23: 35-42.  
Thème(s): BIOMASS COMPOSITION
- 170 MORRI, C., BIANCHI, Á C. N., COCITO, Á S., PEIRANO, Á A. (1999) - Biodiversity of marine sessile epifauna at an Aegean island subject to hydrothermal activity: Milos, eastern Mediterranean Sea  
Marine Biology - 135: 729-739  
Thème(s): SESSILE MACROEPIFAUNA, MARINE BIODIVERSITY, DEEP SEA, AEGEAN ISLAND
- 171 MURA, M., ORRU, F. & A. CAU (2006) - Reproduction strategy of the deep-sea hermit crabs *Pagurus alatus* and *Pagurus excavatus* of the Central-Western Mediterranean Sea  
Hydrobiologia - 557:51–57  
Thème(s): FECUNDITY, HERMIT CRAB, PAGURUS ALATUS, PAGURUS EXCAVATUS, REPRODUCTIVE BIOLOGY, SPAWNING
- 172 MYERS, R. A. and B. WORM, (2003) - Rapid worldwide depletion of predatory fish communities.  
Nature - 423: 280-283.  
Thème(s): PREDATORS, STOCK DEPLETION, TROPHIC CHAIN
- 173 MYTILINEOU, CH., POLITOU CH.-Y (1997) - New records for the presence of the red shrimp, *Aristaeomorpha foliacea* (Risso, 1827) in the Greek waters.  
Proc. 5th Panhel. Symp.Ocean. . Fish., Kavala, April 1997 - vol. II: 87-89.  
Thème(s): RED SHRIMP, ARISTAEOMORPHA FOLIACEA, EASTERN MEDITERRANEAN
- 174 NAGAHAMA, T., HAMAMOTO, M., NAKASE, T., TAKAMI, H., & K., HORIKOSHI (2001) - Distribution and identification of red yeasts in deep-sea environments around the northwest Pacific Ocean  
Antonie van Leeuwenhoek - 80: 101–110, 2001.  
Thème(s): DEEP-SEA, DISTRIBUTION, IDENTIFICATION, ITS, RED YEASTS, 5.8S RDNA

- 175 NAKASONE, K., IKEGAMI, A., KATO, C., USAMI, R., HORIKOSHI, K., (1998) - Mechanisms of gene expression controlled by pressure in deep-sea microorganisms  
Extremophiles - 2:149–154  
Thème(s): BAROPHILIC BACTERIA, DEEP-SEA BACTERIUM, ELECTROPHORETIC MOBILITY SHIFT ASSAY (EMSA), GENE EXPRESSION, PRESSURE-REGULATED OPERON, TRANS-ACTING FACTORS
- 176 ORSI RELINI, L. AND G. RELINI, (1985) - The red shrimps fishery in the Ligurian Sea: Mismanagement or not?  
FAO Fish. Rep. - 336: 99-106.  
Thème(s): RED SHRIMP, FISHERY, LIGURIAN SEA,
- 177 ORSI RELINI, L. AND G. RELINI, (1988) - An uncommon recruitment of *Aristeus antennatus* (Risso) (Crustacea Decapoda Aristeidae) in the Gulf of Genoa.  
Rapp. Comm. int. Mer Médit. - 31(2): 10.  
Thème(s): ARISTEUS ANTENNATUS, GULF OF GENOVA
- 178 ORSI RELINI, L. AND G. RELINI, (1994) - Biological characteristics of *Aristeus antennatus* as highlighted by long-term observations in the Ligurian Sea.  
NTR-ITPP Spec. Publ. - 3: 27-28.  
Thème(s): BIOLOGICAL CHARACTERISTIC, ARISTEUS ANTENNATUS, LIGURIAN SEA
- 179 PALANQUES, A., J. MARTÍN, P. PUIG, J. GUILLÉN, J. B. COMPANY and F. SARDÀ, (2004) - Sediment gravity flows induced by trawling in the Palamós (Fonera) canyon.  
Rapp. Comm. int. Mer Médit. - 37: 63.  
Thème(s): TRAWLING, PALAMOSCANYON
- 180 PALOMERA, I (1992) - Spawning of anchovy *Engraulis encrasicolus* in the Northwestern Mediterranean relative to hydrographic features in the region.  
Mar. Ecol. Prog. Ser. - 79(3): 215-223.  
Thème(s): ANCHOVY, ENGRAULIS ENCRASICOLUS, NORTHWESTERN MEDITERRANEAN,
- 181 PATHOM-AREE, W., STACH, J.E.M., WARD, A. C., HORIKOSHI, K., BULL, A.T., M., GOODFELLOW (2006) - Diversity of actinomycetes isolated from Challenger Deep sediment (10,898 m) from the Mariana Trench  
Extremophiles - 10:181–189  
Thème(s): MARIANA TRENCH, ACTINOMYCETES, DEEP-SEA, 16S RRNA GENES, PHYLOGENETIC ANALYSIS, NRPS, PKS I, PKS II, DERMACOCCUS
- 182 PEEK A. S., GUSTAFSON Á R. G., LUTZ, Á R. A., VRIJENHOEK, R. C., (1997) - Evolutionary relationships of deep-sea hydrothermal vent and cold-water seep clams (*Bivalvia*: Vesicomidae): results from the mitochondrial cytochrome oxidase subunit I  
Marine Biology - 130: 151-161  
Thème(s): DEEP-SEA, HYDROTHERMAL VENT, BIVALVIA, VESICOMYIDA, DEEP SEA

- 183 PÉRÈS, J. M. (1985) - History of the Mediterranean biota and the colonization of the depths. In: Key environments: Western Mediterranean. R. Margalef (ed.). Pergamon Press, New York. - pp. 198-232.  
Thème(s): MEDITERRANEAN, COLONIZATION, WESTERN MEDITERRANEAN
- 184 PÉRÈS, J. M. and J. PICARD (1964) - Nouveau manuel de bionomie benthique de la Méditerranée. Rec. Trav. St. Mar. Endoume - 47(31): 1-137.  
Thème(s): MEDITERRANEAN BENTHOS, BIONOMY
- 185 PIETSCH, T. W. (2005) - Dimorphism, parasitism, and sex revisited: modes of reproduction among deep-sea ceratioid anglerfishes (Teleostei: Lophiiformes) Ichthyological Research - 52: 207–236  
Thème(s): TELEOSTEI, LOPHIIFORMES, CERATIOIDEI ANGLERFISHES, DEEP SEA, REPRODUCTIVE STRATEGIES, SEXUAL DIMORPHISM, SEXUAL PARASITISM
- 186 POLITOU, CH.-Y., S. KAVADAS, CH. MYTILINEOU, A. TURSI, R. CARLUCCI and G. LEMBO (2003) - Fisheries Resources in the Deep Waters of the Eastern Mediterranean (Greek Ionian Sea). J.Northw. Atl. Fish. Sci. - Vol. 31: 35-46.  
Thème(s): IONIAN SEA, DEEP-WATER FISHERIES
- 187 POLUNIN, N. V. C., B. MORALES-NIN, W. HEROD, J. E. CARTES, J. K. PINNEGAR and J. MORANTA, (2001) - Feeding relationships in Mediterranean bathyal assemblages elucidated by stable nitrogen and carbon isotope data. Mar. Ecol. Prog. Ser. - 220: 13-23.  
Thème(s): FEEDING RELATIONSHIP, MEDITERRANEAN, STABLE NITROGEN, CARBON ISOTOPE
- 188 POLYMENAKOU, P.N., BERTILSSON, S., TSELEPIDES, A., AND STEPHANOU, E.G., (2003) - Links between Geographic Location, Environmental Factors, and Microbial Community Composition in Sediments of the Eastern Mediterranean Sea MICROBIAL ECOLOGY - 49, 367–378  
Thème(s): BACTERIAL COMMUNITY, GEOGRAPHIC LOCATION, DEEP SEA, EASTERN MEDITERRANEAN SEA
- 189 PORTE, C., E. ESCARTÍN, L. M. GARCÍA, M. SOLÉ and J. ALBAIGÉS (2000) - Xenobiotic metabolising enzymes and antioxidant defences in deep-sea fish: relationship with contaminant body burden. Mar. Ecol. Prog. Ser., - 192: 259-266.  
Thème(s): XENOBIOTIC, ANTIOXIDANT DEFENCE, DEEP-SEA FISH, BODY BURDEN

- 190 PROKOFEVA, M.I., KUBLANOV, I.V., NERCESSIAN, O., TOUROVA, T. P., KOLGANOVA, T.V., LEBEDINSKY, A.V. (2005) - Cultivated anaerobic acidophilic/acidotolerant thermophiles from terrestrial and deep-sea hydrothermal habitats  
Extremophiles - 9: 437–448  
Thème(s): ACIDIC HOT SPRINGS, DEEP-SEA HYDROTHERMAL VENTS, THERMOPHILES, ANAEROBES, ACIDOPHILES, ACIDOTOLERANT MICROORGANISMS
- 191 PUIG, P., J. B. COMPANY, F. SARDÀ and A. PALANQUES (2001) - Responses of deep-water megafaunal populations to the presence of nepheloid layers on the continental margins  
Deep- Sea Res. - 48: 2195-2207.  
Thème(s): DEEP-WATER, MEGAFUNAL,
- 192 PUTTMAN, R. J (1994) - Community ecology.  
Chapman and Hall, London. - 178 pp.  
Thème(s): ECOLOGY
- 193 QUETGLAS. A., GONZALEZ, M., CQRBONELL, A., SANCHEZ, P., (2001) - Biology of the deep-sea octopus *Bathypolypus sponsalis* (Cephalopoda: Octopodidae) from the western Mediterranean Sea  
Marine Biology - 138: 785-792  
Thème(s): DEEP-SEA OCTOPUS, BIOLOGY, WESTERN MEDITERRANEAN SEA
- 194 RAGONESE, S., & M.L. BIANCHINI (2006) - Trawl selectivity trials on the deep-water rose shrimp (*Parapenaeus longirostris*) in Sicilian waters  
Hydrobiologia - 557:113–119  
Thème(s): TRAWL NET SELECTIVITY, ROSE SHRIMP, PARAPENAEUS LONGIROSTRIS, MEDITERRANEAN SEA
- 195 RAGONESE, S., ZAGA, M., DI STEFANO, L., & M.L. BIANCHINI (2001) - Effect of codend mesh size on the performance of the deep-water bottom trawl used in the red shrimp fishery in the Strait of Sicily (Mediterranean Sea)  
Hydrobiologia - 449: 279–291, 2001.  
Thème(s): BOTTOM TRAWL, CODEND RETENTION, DEEP-WATER SHRIMP, ARISTAEOMORPHA FOLIACEA, MEDITERRANEAN SEA
- 196 RAGUENES, G., CAMBON-BONAVITA, M.A., LOHIER, J.F., BOISSET, C., J.GUEZENNEC (2003) - A Novel, Highly Viscous Polysaccharide Excreted by an *Alteromonas* Isolated from a Deep-Sea Hydrothermal Vent Shrimp  
CURRENT MICROBIOLOGY - Vol. 46 (2003), pp. 448–452  
Thème(s): HETEROTROPHIC MICROORGANISM, DEEP-SEA, MESOPHILIC, AEROBIC, HYDROTHERMAL VENT SHRIMP
- 197 RAVAUX, J., ZBINDEN, M., VOSS-FOUCART, M. F., COMPERE, P., GOFFINET G., GAILL, F. (2003) - Comparative degradation rates of chitinous exoskeletons from deep-sea environments  
Marine Biology - 143: 405–412  
Thème(s): HYDROTHERMAL VENT, DEGRADATION RATE, RIFTIA PACHYPTILA,

- 198 RELINI, G. and L. RELINI ORSI (1987) - The decline of red shrimp stocks in the Gulf of Genoa.  
Invest. Pesq. - 51 (suppl. 1): 245-260.  
Thème(s): DECLINE, RED SHRIMP, GULF OF GENOA
- 199 RELINI, G., RELINI, M., & M., MONTANARI (2000) - An offshore buoy as a small artificial island and a fish-aggregating device (FAD) in the Mediterranean  
Hydrobiologia - 440: 65–80, 2000.  
Thème(s): MACROFOULING, SETTLEMENT, OFFSHORE, BUOY, FISHES, FAD, LIGURIAN SEA
- 200 REX, M. A (1977) - Zonation in deep-sea gastropods: the importance of biological interactions to rates of zonation.  
B. F. Keenan, P. O. Ceidigh and P. J. S. Boaden (eds). Biology of benthic organisms, 11th European Symposium on Marine Biology, Galway - pp. 521-529  
Thème(s): DEEP-SEA, GASTROPOD, BIOLOGICAL INTERACTION
- 201 K. RIEMANN-ZURNECK (2000) - *Oractis bursifera* sp. Nov., Arctic deep-sea anemone with peculiar invagination of its oral disc (Cnidaria : Actiniaria)  
Polar Biol - 23: 604–608  
Thème(s): ORACTIS BURSIFERA, ARCTIC DEEP-SEA, ANEMONE
- 202 RICHER DE FORGES, B., J. A. KOSLOW and G. C. B. POORE, (2000) - Diversity and endemism of the benthic seamount fauna in the southwest Pacific.  
Nature - 405: 944-947.  
Thème(s): DIVERSITY, ENDEMISM, BENTHIC SEAMOUNT FAUNA
- 203 RISSO, A (1816) - Histoire naturelle des crustacés des environs de Nice  
Paris - 175 pp.  
Thème(s): CRUSTACE
- 204 ROBERTS, C. M (2002) - Deep impact: the rising toll of fishing in the deep sea  
Trends Ecol. Evol., - 17(5): 242-245.  
Thème(s): FISHING, DEEP SEA
- 205 ROBERTS, D. and H. M. MOORE (1997) - Tentacular diversity in deep-sea deposit-feeding holothurians: implications for biodiversity in the deep sea  
Biodiversity and Conservation - 6, 1487 - 1505 (1997)  
Thème(s): BIODIVERSITY, DEEP SEA, DEPOSIT-FEEDING, HOLOTHURIAN
- 206 ROGERS, A. D (1994) - The biology of seamounts.  
Adv. Mar. Biol. - 30: 305-350.  
Thème(s): SEAMOUNTS
- 207 ROWE, G. T. and R. J. MENZIES (1969) - Zonation of large benthic invertebrates in the deep-sea off the Carolinas.  
Deep-Sea Res. - 16: 531-537.  
Thème(s): BENTHIC INVERTEBRATE, DEEP-SEA, CAROLINAS,

- 208 RUFFO, S (1998) - The Amphipoda of the Mediterranean.  
Part 4. Mém. Inst. Océanog. Monaco - 3: 1-959.  
Thème(s): MEDITERRANEAN AMPHIPODA
- 209 SALAS, C (1996) - Marine bivalves from off the southern Iberian peninsula collected by the BALGIM and Fauna 1 Expeditions  
Haliotis - 25: 33-100.  
Thème(s): MARINE BIVALVES, SOUTHERN IBERIAN PENINSULA
- 210 SARÀ, M (1985) - Ecological factors and their biogeographic consequences in the Mediterranean Ecosystems.  
Mediterranean Marine Ecosystems. M. Moraitou-Apostolopoulou and V. Kiortsis (eds.). Plenum Press, New York. - pp.1-17.  
Thème(s): ECOLOGICAL FACTOR, ECOSYSTEM, MEDITERRANEAN, BIOGEOGRAPHIC CONSEQUENCE
- 211 SARDÀ, F. and J. E. CARTES (1993) - Relationship between size and depth in decapod crustacean populations on the slope between 900 and 2200 m in the Western Mediterranean.  
Deep-Sea Res. - 40 (11-12): 2389-2400.  
Thème(s): DECAPOD CRUSTACEAN, SLOPE, WESTERN MEDITERRANEAN,
- 212 SARDÀ, F., J. E. CARTES and W. NORBIS (1994) - Spatio-temporal structure of the deep-water shrimp *Aristeus antennatus* (Decapoda: Aristeidae) population in the western Mediterranean,  
Fish. Bull. - 92: 599-607.  
Thème(s): DEEP-WATER, SHRIMP, WESTERN MEDITERRANEAN,
- 213 SARDÀ, F., J. B. COMPANY and A. CASTELLÓN (2003) - Intraspecific aggregation structure of a shoal of a western Mediterranean (Catalan coast) deep-sea shrimp, *Aristeus antennatus* (Risso, 1816), during the reproductive period.  
J. Shellfish Res. - 22: 569-579.  
Thème(s): WESTERN MEDITERRANEAN, DEEP-SEA SHRIMP, ARISTEUS ANTENNATUS
- 214 SARDÀ, F., J. B. COMPANY and F. MAYNOU (2003) - Deep-sea shrimp (*Aristeus antennatus* Risso 1816) in the Catalan sea, a review and perspectives.  
J. Northw. Atl. Fish. Sci. - 31: 127-136  
Thème(s): DEEP-SEA, SHRIMP, CATALAN SEA
- 215 SARDÀ, F., A. TURSI, A. TSELEPIDES, A. CALAFAT and M. ESPINO (2004) - An introduction to Mediterranean deep-sea biology.  
Sci. Mar. - Sci. Mar. (in press)  
Thème(s): DEEP-SEA, BIOLOGY, MEDITERRANEAN
- 216 SARDÀ, F., G. D'ONGHIA, CH.-Y. POLITOU, J. B. COMPANY, P. MAIORANO and K. KAPIRIS (2004) - Maximum deep-sea distribution and ecological aspects of *Aristeus antennatus* (Risso, 1816) in the Balearic and Ionian Mediterranean Sea.  
Sci. Mar. - Sci. Mar. (in press).  
Thème(s): DEEP-SEA DISTRIBUTION, ECOLOGICAL ASPECT, ARISTEUS ANTENNATUS, BALEARIC, IONIAN MEDITERRANEAN SEA

- 217 SARDOU O. and MASCLE J., (2003) - Cartographie par sondeur multifaisceaux du Delta sous marin du Nil et des domaines voisins  
Publication spéciale IESM / Géosciences-Azur, série Carte et Atlas. -  
Thème(s): CARTOGRAPHIE, SONDEUR MULTIFAISCEAUX, NIL
- 218 SBRANA,M., VIVA , C., & P., BELCARI (2006) - Fishery of the deep-water rose shrimp *Parapenaeus longirostris* (Lucas, 1846) (Crustacea: Decapoda) in the northern Tyrrhenian Sea (western Mediterranean)  
*Hydrobiologia* - 557:135–144  
Thème(s): PARAPENAEUS LONGIROSTRIS, DEEP-WATER ROSE SHRIMP, FISHERY, SELECTIVITY, DISCARD, WESTERN MEDITERRANEAN
- 219 DI CARLO, S., IANORA, B. A., MAZZOCCHI, M. G. and M. SCARDI, (1991) - Atlantis II cruise: uniformity of deep copepod assemblages in the Mediterranean sea.  
*J. Plankton Res.* - 13(2): 263-277.  
Thème(s): DEEP COPEPOD, MEDITERRANEAN SEA
- 220 SMITH, P.J., MCVEAGH, S. M., MINGOIA, J. T., FRANCE, S. C. (2004) - Mitochondrial DNA sequence variation in deep-sea bamboo coral (Keratoisidinae) species in the southwest and northwest Pacific Ocean  
*Marine Biology* - 144: 253–261  
Thème(s): MITOCHONDRIAL DNA, DEEP-SEA, BAMBOO CORAL, PACIFIC OCEAN
- 221 SOLÉ, M., C. PORTE and J. ALBAIGÉS (2001) - Hydrocarbons, PCBs and DDT in the NW Mediterranean deep-sea fish *Mora moro*.  
*Deep-Sea Res.* - 495-513.  
Thème(s): HYDROCARBON, DDT, PCB, NW MEDITERRANEAN, DEEP-SEA FISH, MORA MORO
- 222 STEFANESCU, C., J. RUCABADO and D. Lloris (1992) - Depth-size trends in western Mediterranean demersal deep-sea fishes.  
*Mar. Ecol. Prog. Ser.* - 81: 205-213.  
Thème(s): WESTERN MEDITERRANEAN, DEEP-SEA, DEMERSAL FISHES
- 223 STEFANESCU, C., D. LLORIS and J. RUCABADO (1993) - Deep-fish assemblages in the Catalan Sea (western Mediterranean) below a depth of 1000 m.  
*Deep-Sea Res.*, - 695-707  
Thème(s): DEEP-FISH, CATALAN SEA
- 224 STEFANESCU, C., B. MORALES-NIN and E. MASSUTÍ (1994) - Fish assemblages on the slope in the Catalan Sea (Western Mediterranean): Influence of a submarine canyon.  
*J. Mar. Biol. Assoc. U. K* - 74: 499-512.  
Thème(s): FISH ASSEMBLAGE, SUBMARINE CANYON, CATALAN SEA, WESTERN MEDITERRANEAN,

- 225 STORA, G., M. BOURCIER, A. ARNOUX, M. GERINO, J. CAMPION, F. GILBERT and J. P. DURBEC, (1999) - The deep-sea macrobenthos on the continental slope of the northwestern Mediterranean Sea: a quantitative approach  
Deep-Sea Res. - 46: 1339-1368.  
Thème(s): DEEP-SEA, MACROBENTHOS, CONTINENTAL SLOPE, NORTHWESTERN MEDITERRANEAN SEA
- 226 TAKAI, K., GAMO, T., TSUNOGAI, U., NAKAYAMA, N., HIRAYAMA, H., NEALSON, K. H., HORIKOSHI, K. (2004) - Geochemical and microbiological evidence for a hydrogen-based, hyperthermophilic subsurface lithoautotrophic microbial ecosystem (HyperSLiME) beneath an active deep-sea hydrothermal field  
Extremophiles - 8:269–282  
Thème(s): CENTRAL INDIAN RIDGE, DEEP-SEA HYDROTHERMAL VENT, HYDROGEN-OXIDIZING, HYPERTHERMOPHILIC, METHANOGEN, SUBSURFACE
- 227 TAKAMI, H., NISHI, S., SHIGERU SHIMAMURA, J.L. , TAKAKI, Y. (2004) - Genomic characterization of thermophilic *Geobacillus* species isolated from the deepest sea mud of the Mariana Trench  
Extremophiles - 8:351–356  
Thème(s): DEEP-SEA ISOLATE, GENOME ANALYSIS, *GEOBACILLUS KAUSTOPHILUS*, *GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS*, 16S RDNA SEQUENCE, THERMOPHILE
- 228 TAVIANI, M., REMIA, A., CORSELLI, C., FREIWALD, A., MALINVERNO, E., MASTROTOTARO, F., SAVINI, A., TURSI, A., (2005) - First geo-marine survey of living cold-water *Lophelia* reefs in the Ionian Sea (Mediterranean basin)  
Facies - 50:409–417  
Thème(s): DEEP CORAL, LIVING *LOPHELIA* REEFS, IONIAN SEA, MEDITERRANEAN, RECENT
- 229 TER BRAAK, C. J. F. and I. C. PRENTICE (1988) - A theory of gradient analysis  
Adv. Ecol. Res., - 18: 272-217.  
Thème(s): MODELLING
- 230 THATJE, S., BACARDIT, R., ARNTZ, W.E. (2005) - Larvae of the deep-sea Nematocarcinidae (Crustacea: Decapoda: Caridea) from the Southern Ocean Received  
Polar Biol - 28: 290–302  
Thème(s): *NEMATOCARCINUS LONGIROSTRIS*, SOUTH-WESTERN ATLANTIC OCEAN, SOUTHERN OCEAN,
- 231 THIEL, M., (2002) - Cindy Lee Van Dover: The ecology of deep-sea hydrothermal vents  
Helgol Mar Res - 55:308–309  
Thème(s): DEEP-SEA, HYDROTHERMAL VENTS, ECOLOGY
- 232 THISTLE, D., (2001) - Harpacticoid copepods are successful in the soft-bottom deep sea  
Hydrobiologia - 453/454: 255–259, 2001.  
Thème(s): DEEP SEA, HARPACTICOIDA

- 233 TIEFENBACHER, L., (2001) - Recent samples of mainly rare decapod Crustacea taken from the deep-sea floor of the southern West Europe Basin  
Hydrobiologia - 449: 59–70, 2001.  
Thème(s): NE-ATLANTIC, DEEP-SEA FLOOR, CRUSTACEA, DECAPODA, REPTANTIA, NATANTIA
- 234 TORTONESE, E (1985) - Distribution and ecology of ecology s in the Mediterranean fauna (Fishes and Echinoderms).  
Mediterranean marine ecosystems. M. Moraitou- Apostolopoulou and V. Kiortsis (eds.). Plenum Press, New York. - pp. 57-83.  
Thème(s): DISTRIBUTION, ECOLOGY, MEDITERRANEAN FAUNA
- 235 TSELEPIDES, A. and A. ELEFThERIOU (1992) - South Aegean (Eastern Mediterranean) continental slope benthos: Macroinfaunal - Environmental relationships. Deep-sea food chains and the global carbon cycle. G. T. Rowe and V. Pariente (eds.). Kluwer Academic Publisher, Dordrecht. - p. 139-156.  
Thème(s): SOUTH AEGEAN, EASTERN MEDITERRANEAN, BENTHOS, MACROINFAUNAL
- 236 TSELEPIDES, A. and N. LAMPADARIOU (2004) - Deep-sea meiofaunal community structure in the Eastern Mediterranean: are trenches benthic hotspots?  
Deep-Sea Res., - 51: 833-847.  
Thème(s): DEEP-SEA, MEIOFAUNAL COMMUNITY, EASTERN MEDITERRANEAN
- 237 TSELEPIDES, A., N. PAPADOPOULOU, D. PODARAS, W. PLAITI and D. KOUTSOUBAS, (2000) - Macrobenthic community structure over the continental margin of Crete (South Aegean Sea, NE Mediterranean)  
Prog. Oceanogr. - 46(2-4): 401-428.  
Thème(s): MACROBENTHIC COMMUNITY, CONTINENTAL MARGIN, CRETE, NE MEDITERRANEAN
- 238 TURLEY, C. M., M. BIANCHI, U. CHRISTAKI, P. CONAN, J. R. W. HARRIS, S. PSARRA, G. RUDDY, E. D. STUTT, A. TSELEPIDES and F. VAN WAMBEKE, (2000) - Relationships between primary producers and bacteria in an oligotrophic sea – the Mediterranean and biogeochemical implications.  
Mar. Ecol. Prog. Ser. - 193: 11-18.  
Thème(s): PRIMARY PRODUCER, BACTERIA, OLIGOTROPHIC SEA, MEDITERRANEAN, BIOGEOCHEMICAL IMPLICATIONS
- 239 TURSI, A., F. MASTROTOTARO, A. MATARRESE, P. MAIORANO and G. D'ONGHIA, (2004) - Biodiversity of the white coral reefs in the Ionian Sea (Central Mediterranean).  
Chemistry and Ecology, 20 - 20 (suppl. 1): 107-116.  
Thème(s): WHITE CORAL REEF, BIODIVERSITY, IONIAN SEA
- 240 WANG,P., XIAO, X., WANG, F., (2005) - Phylogenetic analysis of Archaea in the deep-sea sediments of west Pacific Warm Pool  
Extremophiles - 9:209–217  
Thème(s): CRENARCHAEOTA MARINE GROUP I, DEEP-SEA, NOVEL ARCHAEA, WEST PACIFIC, DIVERSITY

- 241 WAYLAND, M.T., SOMMERVILLE, C., & D.I. GIBSON (1999) - *Echinorhynchus brayi* n. sp. (Acanthocephala: Echinorhynchidae) from *Pachycara crassiceps* (Roule) (Zoarcidae), a deep-sea fish  
Systematic Parasitology - 43: 93–101, 1999.  
Thème(s): ECHINORHYNCHUS BRAYI, BENTHIC MARINE FISHES, DEEP-SEA
- 242 WENNER, E. L. and D. F. BOESCH, (1979) - Distribution patterns of epibenthic decapod Crustacea along the shelf-slope coenocline, middle Atlantic Bight, USA.  
Bull. Biol. Soc. Washington, - 3: 106-133.  
Thème(s): EPIBENTHIC, DECAPOD CRUSTACEA, SHELF-SLOPE COENOCLINE, MIDDLE ATLANTIC BIGHT
- 243 WHITEHEAD, P. J. P., M.-L. BAUCHOT, J.-C. HUREAU, J. NIELSEN and E. TORTONESE (1989) - Fishes of the north-eastern Atlantic and the Mediterranean.  
UNESCO, Paris. - Vols. 1-3.  
Thème(s): FISH, NORTH-EASTERN ATLANTIC, MEDITERRANEAN
- 244 WILSON, E. O. (1988) - Biodiversity  
National Academic Press, Washington, DC. -  
Thème(s): DEEP SEA BIODIVERSITY
- 245 WILSON, E. O. (1992) - The diversity of life  
The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass. -  
Thème(s): MARINE BIODIVERSITY
- 246 WISHNER, K. F (1980) - The biomass of the deep-sea benthopelagic plankton.  
Deep-Sea Res. - 27(3-4A): 203-216.  
Thème(s): BENTHOPELAGIC PLANKTON, BIOMASS, DEEP-SEA
- 247 YAKIMOV M.M., GIULIANO, L., CAPPELLO, S., DENARO, R., GOLYSHIN, P. N., (2007) - Microbial Community of a Hydrothermal Mud Vent Underneath the Deep-Sea Anoxic Brine Lake Urania (Eastern Mediterranean)  
Orig Life Evol Biosph - 37:177–188  
Thème(s): DEEP-SEA HYPERSALINE ANOXIC BASINS, HYDROTHERMAL MUD FLUIDS, 16S RRNA, MICROBIAL COMMUNITY STRUCTURE AND FUNCTION
- 248 ZABALA, M., P. MALUQUER and J.-G. HARMELIN (1993) - Epibiotic bryozoans on deep-water scleractinian corals from the Catalanian slope (western Mediterranean, Spain, France).  
Sci. Mar. - 57(1): 65-78.  
Thème(s): EPIBIOTIC BRYOZOAN, DEEP-WATER, SCLERACTINIAN CORAL, CATALONIAN SLOPE, WESTERN MEDITERRANEAN
- 249 ZENG, R., XIONG, P., WEN, J., (2006) - Characterization and gene cloning of a cold-active cellulase from a deep-sea psychrotrophic bacterium *Pseudoalteromonas* sp. DY3  
Extremophiles - 10:79–82  
Thème(s): DEEP SEA, PSEUDOALTEROMONAS, COLD-ACTIVE CELLULASE

- 250 ZIBROWIUS, H (1980) - The scleractinian corals of the Mediterranean and the North-East Atlantic.  
Mém. Inst. Océanog. Monaco - 11: 1-391.  
Thème(s): SCLERACTINIAN CORALS, MEDITERRANEAN, NORTH-EAST ATLANTIC